

Obstbau- Pflanzenschutz- warndienst

**Mittwoch, 2. Juli 2025,
12:00 Uhr**

Wetter

Heute und morgen Vormittag noch sehr warm und weitgehend trocken. Ab morgen Mittag gewittrig. Am Samstag trocken, danach geht es wieder unbeständig in die neue Woche. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Kernobst

Heute oder morgen Früh einen neuen **Schorfschutz** aufbringen, zB mit Delan, *in Bio Netzschwefel (bis max. 25 °C) oder Kumar, bei berostungsrobusten Sorten auch Kupfer. Alternativ am Freitag Nachmittag abstoppend aufs nasse Laub Curatio (bienengefährlich) oder Vitsan plus Netzschwefel plus Netzmittel.*

Der Schorfspritzung ein **Mehltaumittel** zugeben, zB Topas (*in Bio: Schwefel und Curatio/Schwefelkalk bekämpfen auch den Mehltau*). Mehltautriebe laufend ausbrechen.

Apfelwickler: Die 1. Generation geht dem Ende des Larvenschlupfes entgegen. Dennoch eine Grundbekämpfung für Nachzügler mit Granulosevirus durchführen (Nicht mischbar mit Curatio).

Da und dort sind **Blutläuse** zu sehen. Wenn es keine gravierenden Probleme gibt, dann noch die Tätigkeit der Blutlauszehrwespe (Nützling) abwarten. Wollige Bereich anpusten. Geht die „Wolle“ ab, sieht man an den freiliegenden Läusen oft schon die Schlupflöcher des Nützlings.

Steinobst

Blattkrankheiten/Fruchtfäulen: Blattkrankheiten befallen junge, hellgrüne Blätter, Fruchtfäulen Früchte ab dem Umfärben. Ist einer dieser Faktoren vorhanden, dann vor Niederschlägen ca. alle 10 Tage eine Behandlung durchführen, zB mit Score (Wartezeit 14 T.), Switch (WZ 14 T), Signum (WZ 7 T) oder Teldor (WZ 3 T), v.a. *in Bio: vorbeugend: Kumar (WZ 1 T) oder abstoppend aufs nasse Laub: Curatio (bienengefährlich!) bzw. Vitsan plus Netzschwefel plus Netzmittel.*

Pflaumenwickler: Der Larvenschlupf der 2. Generation hat in frühen Lagen begonnen, in späten Lagen startet er Ende der Woche.

Strategie: Sortenweise je nach Erntezeitpunkt 5-6 Wochen vor der Ernte

- eine Behandlung mit Coragen, Inecor, Shenzi oder Voliam (WZ 14 T, bienen-gefährlich!), **oder**
- bis zu zwei Behandlungen mit Affirm Opti (WZ 7 Tage, bienengefährlich!),
- *in Bio: Lepinox Plus (max. 3x, keine Wartezeit).*

Bei den aktuell sehr heißen Temperaturen **keine Blattdünger** zugeben!

Bei allen Behandlungen Wartezeiten reichlich einhalten!

Bei bienengefährlichen Mitteln blühenden Unterwuchs entfernen!

Notwendige Behandlungen in der kühleren Tageszeit bei Temperaturen unter 25 °C und nicht bei Wind durchführen.

warndienst.at <input type="checkbox"/>	Mail <input type="checkbox"/>	Fax <input type="checkbox"/>	hortigate <input type="checkbox"/>	WhatsApp <input type="checkbox"/>
---	---	---	---	--