

Obstbau- Pflanzenschutz- warndienst

**Dienstag, 4. August 2026,
15:00 Uhr**

*Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Natalie Ströhle und ich darf mich heute noch kurz als eure Ansprech-
partnerin für den Bereich Obst- und Weinbau vorstellen. Ursprünglich im Weinbau
beheimatet, darf ich nun voller Vorfreude mein Wissen und meine Erfahrungen im
Obstbau erweitern. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und
den gemeinsamen Austausch.*

Wetter

Es soll zwar warm bis heiß bleiben, allerdings gewittrig werden. Die meisten Wetter-
dienste sagen für Mittwoch und Donnerstag zeitweise Regen vorher. Ob es überall
und, wenn ja, wieviel regnet, ist bei Gewittern immer schwer vorherzusagen. Am Wo-
chenende wieder gewohnt sommerlicher Temperaturen bis maximal 31 °C.

Kernobst

Schorf, Marssonina, Regenflecken, Mehltau: aufgrund der derzeitigen Wetterlage
keine Gefahr. Durch die Lagerbehandlung mit Flint erfolgt gleichzeitig eine Mehltau-
behandlung.

Apfelwicklerbekämpfung fortsetzen (hier ist der Einsatz des **Granulosevirus aus-
reichend**), **Calciumblattdüngungen** (Anwendung nur bei Temperaturen **unter
25 °C** bzw. **keine direkte Sonneneinstrahlung**) gg. Stippe durchführen.

Bestand auf allfälligen Befall durch **Blut- und Schildläuse** sowie **Spinn- und Rost-
milben** kontrollieren.

Für Lageräpfel entsprechend die **Lagerbehandlungen** durchführen (idR zunächst
Captan/WZ 21 T, dann Flint/WZ14 T, *in Bio Kupfer/WZ 14 T*). **Unbedingt Wartefris-
ten zwischen der letzten Anwendung und der Ernte beachten!**

Abschlussspritzungen Lageräpfel 2026

Strategie für Lageräpfel 2026	ca. 5 Wochen vor Erntebeginn: 1. Captanspritzung ; ca. 4 Wochen vor Erntebeginn: 2. Captanspritzung , ca. 3 Wochen vor Erntebeginn: Flint-Spritzung
Bio-Variante:	Regelmäßig Bikarbonate gg. Regenflecken (zB Vitisan, Kumar, Karma). Gg. Marssonina und Alternaria Curatio (bis 10.9. erlaubt, WZ 21 Tage). Ab 6 Wochen vor der Ernte bei unempfindlichen Sorten 1x Kupfer, alternativ Blossom Protect mehrmals vor der Ernte (keine WZ)

Apfel	Frühe Lagersorten		Mittelfrühe Lagersorten			Späte Lagersorten	
	Elstar, Santana	Gala, Freya/ WUR037	Boskoop, Topaz, Ladina	Jonagold	WUR029/ Bloss	Natyra/Magic Star/SQ159	Braeburn
geschätzter Erntebeginn (Höchst)	26.08.2026	04.09.2026	17.09.2026	20.09.2026	25.09.2026	08.10.2026	11.10.2026
Letzte Möglichkeit 1. Captanspritzung , Merpan 80 WDG (Reg.-Nr. 2803), <i>Captan Plus 80 WDG (3628) Merpan 48 SC (3820), Scab 480 SC (3938): WZ 21 Tage; bzw. Malvin WG (Reg.-Nr. 3074): WZ 14 Tage; Abstand zur 2. Captanspritzung mind. 7 Tage</i>		06.08.	19.08.	22.08.	27.08.	09.09.	12.09.
Letzte Möglichkeit 2. Captanspritzung , Merpan 80 WDG (Reg.-Nr. 2803), <i>Captan Plus 80 WDG (3628) Merpan 48 SC (3820), Scab 480 SC (3938): WZ 21 Tage; bzw. Malvin WG (Reg.-Nr. 3074): WZ 14 Tag</i>	04.08.	13.08.	26.08.	29.08.	03.09.	16.09.	19.09.
Letzte Möglichkeit Flint-Spritzung (2758): WZ 14 Tage	11.08.	20.08.	02.09.	05.09.	10.09.	23.09.	26.09.
Letzte Möglichkeit Bellis (3156) (nur empfindliche Sorten als 3. oder 4. Spritzung): WZ 7 Tage ODER	18.08.	27.08.	09.09.	12.09.	17.09.	30.09.	03.10.
Letzte Möglichkeit Switch (2619), Geoxe (3528) etc. (nur empfindliche Sorten als 3. oder 4. Spritzung): WZ 3 Tage (Empfehlung: 7 T)	22.08.	31.08.	13.09.	16.09.	21.09.	04.10.	07.10.
Vitisan (Reg.-Nr. 3578) (evtl. bei Anlagen mit Schorfbefall oder bei Nässe während der Ernte): Keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit

	= Behandlung noch möglich
	= Behandlung nicht mehr möglich
	= normalerweise nicht nötig

Bitte die Wartezeit reichlich einhalten.

Zwetschken

Auf **Fruchtfäulen** achten. In empfindlichen Sorten evtl. kranke Früchte auspflücken.

Strategie: Abschlussbehandlung bei ungedeckte Kulturen (spätreifende Sorten) gegen **Fruchtmonilia**, zB mit Teldor (WZ 3 T, *Startzeit aufzeichnen, max. 2x/Jahr und keine unmittelbar aufeinanderfolgende Anwendung, bienengefährlich – nur nach Ende des Bienenflugs bis 23 Uhr*)

KEF: Bestand auf Befall kontrollieren und je nach Druck ggf noch Behandlung vornehmen.
Unbedingt Wartezeiten zwischen der letzten Anwendung und der Ernte beachten!

Pflaumenwickler: Strategie: Sortenweise je nach Erntezeitpunkt 5-6 Wochen vor der Ernte:

- eine Behandlung mit Coragen (WZ 14 T, bienengefährlich, max. 1x/Jahr), **oder**
- bis zu zwei Behandlungen mit Affirm Opti (WZ 7 Tage, bienengefährlich!),

in Bio: Lepinox Plus (max. 3x, keine Wartezeit).

Bei allen Behandlungen Wartezeiten reichlich einhalten!

Bei heißen Temperaturen **keine Blattdünger** zugeben!

Vor dem Einsatz bienengefährlicher Mittel blühenden Unterwuchs entfernen!

Notwendige Behandlungen in der kühleren Tageszeit bei Temperaturen unter 25 °C und nicht bei Wind durchführen.

warndienst.at ☐

Mail ☐

Fax ☐

hortigate ☐

WhatsApp ☐