

Obstbau- Pflanzenschutz- warndienst

**Montag, 17. August 2026,
11:00 Uhr**

Wetter

Diese Woche soll es deutlich abkühlen mit gemäßigten Niederschlägen. Einzig am Mittwoch könnte es nochmals sommerlich heiß werden.

Aktuelles

Kommende Woche (KW 35) erfolgt keine Aussendung des Obstbauwarndienstes. Es sind jedoch keine großen Änderungen für die kommende Woche zu erwarten. Daher die untenstehenden Empfehlungen entsprechend den Anwendungsbestimmungen und der jeweiligen Wartefristen zwischen der letzten Anwendung und der Ernte anpassen und reichlich einhalten.

Kernobst

Aufgrund der nun wieder gemäßigten Temperaturen kann eine **Calciumblattdüngungen gg. Stippe** durchgeführt werden. Bitte entsprechende Voraussetzungen für die Behandlung beachten ($T < 25^{\circ}\text{C}$).

Apfelwicklerbekämpfung mit dem **Granulosevirus** fortsetzen. Durch die deutlich kühleren Temperaturen kann nun von einer deutlich längeren Wirkungsdauer ausgegangen werden. **Bitte Wartefristen zwischen der letzten Anwendung und Ernte beachten.**

Für Lageräpfel entsprechend die **Lagerbehandlungen** durchführen (idR zunächst Capitan/WZ 21 T, dann Flint/WZ14 T, in Bio Kupfer/WZ 14 T) – weitere Infos siehe Tabelle S. 2. **Unbedingt Anwendungsbestimmungen und Wartefristen zwischen der letzten Anwendung und der Ernte beachten!**

Bei allen Behandlungen Wartezeiten reichlich einhalten!

Bei heißen Temperaturen **keine Blattdünger** zugeben!

Vor dem Einsatz bienengefährlicher Mittel blühenden Unterwuchs entfernen!

Notwendige Behandlungen in der kühleren Tageszeit bei Temperaturen unter 25°C und nicht bei Wind durchführen.

Abschlussgespräch Lageräpfel 2026

Strategie für Lageräpfel 2026	ca. 5 Wochen vor Erntebeginn: 1. Captanspritzung ; ca. 4 Wochen vor Erntebeginn: 2. Captanspritzung , ca. 3 Wochen vor Erntebeginn: Flint-Spritzung
Bio-Variante:	Regelmäßig Bikarbonate gg. Regenflecken (zB Vitisan, Kumar, Karma). Gg. Marssonina und Alternaria Curatio (bis 10.9. erlaubt, WZ 21 Tage). Ab 6 Wochen vor der Ernte bei unempfindlichen Sorten 1x Kupfer, alternativ Blossom Protect mehrmals vor der Ernte (keine WZ)

Apfel	Frühe Lagersorten		Mittelfrühe Lagersorten			Späte Lagersorten	
	Elstar, Santana	Gala, Freya/ WUR037	Boskoop, Topaz, Ladina	Jonagold	WUR029/ Bloss	Natyra/Magic Star/SQ159	Braeburn
geschätzter Erntebeginn (Höchst)	26.08.2026	04.09.2026	17.09.2026	20.09.2026	25.09.2026	08.10.2026	11.10.2026
Letzte Möglichkeit 1. Captanspritzung , Merpan 80 WDG (Reg.-Nr. 2803), <i>Captan Plus 80 WDG (3628) Merpan 48 SC (3820), Scab 480 SC (3938): WZ 21 Tage; bzw. Malvin WG (Reg.-Nr. 3074): WZ 14 Tage; Abstand zur 2. Captanspritzung mind. 7 Tage</i>			19.08.	22.08.	27.08.	09.09.	12.09.
Letzte Möglichkeit 2. Captanspritzung , Merpan 80 WDG (Reg.-Nr. 2803), <i>Captan Plus 80 WDG (3628) Merpan 48 SC (3820), Scab 480 SC (3938): WZ 21 Tage; bzw. Malvin WG (Reg.-Nr. 3074): WZ 14 Tag</i>			26.08.	29.08.	03.09.	16.09.	19.09.
Letzte Möglichkeit Flint-Spritzung (2758): WZ 14 Tage		20.08.	02.09.	05.09.	10.09.	23.09.	26.09.
Letzte Möglichkeit Bellis (3156) (nur empfindliche Sorten als 3. oder 4. Spritzung): WZ 7 Tage ODER	18.08.	27.08.	09.09.	12.09.	17.09.	30.09.	03.10.
Letzte Möglichkeit Switch (2619), Geoxe (3528) etc. (nur empfindliche Sorten als 3. oder 4. Spritzung): WZ 3 Tage (Empfehlung: 7 T)	22.08.	31.08.	13.09.	16.09.	21.09.	04.10.	07.10.
Vitisan (Reg.-Nr. 3578) (evtl. bei Anlagen mit Schorfbefall oder bei Nässe während der Ernte): Keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit	keine Wartezeit
	= Behandlung noch möglich						
	= Behandlung nicht mehr möglich						
	= normalerweise nicht nötig						

Bitte die Wartezeit reichlich einhalten.