ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen

***Erklärungen:**

Köder	Mittel muss tief und unzugänglich für Vögel und Säugetiere in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Mittel an der Oberfläche zurückbleiben!
LWF	Max. mögliche Fläche bei Dosierung nach Laubwandfläche. Aufwandmenge nach LWF (Laubwandfläche) berechnen
SDHI (FRAC 7)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den SDHI´s: Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyrazam
DMI (FRAC 3)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den DMI´s (SSH): Difenoconazol, Penconazol, Tebuconazol, Tetraconazol, Myclobutanil, Mefentrifluconazol
Anilinopyrimidine (FRAC 9)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den Anilinopyrimidinen: Cyprodinil, Mepanipyrim, Pyrimethanil
Strobilurine (FRAC 11)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den Strobilurinen: Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Kresoxim-methyl, Trifloxystrobin
FRAC M04	Folgende Wirkstoffe gehören zur FRAC M04 Gruppe: Captan, Folpet
IRAC 6	Folgende Wirkstoffe gehören zur IRAC 6 Gruppe: Abamectin, Emamectin benzoate, Milbemectin

Zulässige Insektizide und Akarizide (Apfel)

3550	Acorit 250 SC	Hexythiazox	Spinnmilben (Eier u. Larven)	0,13	0,4	Knospenschwellen bis Beginn Fruchtreife	1	1	Hexythiazox oder Clofentezin max. 1x/Jahr	-	31.08.2024	28
4080	Affirm Opti *(bienengefährlich)*	Emamectin	Apfelwickler	0,69	2,06	Fruchtdurchmesser 10 mm bis Beginn Fruchtreife	3	3	*IRAC 6; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	7	30.04.2025	7
3383/902	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Ende Blattknospenschwellen bis Mausohrstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/Jahr	-	31.12.2024	-
2633	Austriebsspritzmittel Promanal Neu	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Beginn Knospenschwellen bis Grünknospenstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/Jahr	-	31.12.2024	-
			Schildläuse (überwinternde Stadien)	10	30	Beginn Knospenschwellen bis Grünknospenstadium	1			-		-
3968	Bactospeine DF	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	Freifressende Schmetterlingsraupen	15.000m² LWF*	1,5	Ab Schlüfen der ersten Larven von Rotknospenstadium b. 80% Fruchtgröße	8	8	-	7	-	-
2622/902	biohelp Neudosan	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2633/904	biohelp Promanal	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2699/903	Bio-Schädlingsfrei Neem	Siehe NeemAzal-T/S (2699), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3468	Capex 2	Schalenwickler-Granulosevirus	Schalenwickler	0,05	0,15	Bei Befall bis Ballonstadium	2	4	-	-	Aufbrauchsfrist 01.07.2024	-
			Schalenwickler (Sommergeneration)	0,05	0,15	Bei Befall	2			-		-
2570	Carpovirusine	Apfelwickler-Granulosevirus	Apfelwickler	12.500m² LWF*	1	Fruchtdurchmesser 10 mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6	6	AW-Granulosevirus max. 6x/J	10	-	7
			Pfirsichwickler	12.500m² LWF*	1	Fruchtdurchmesser 10 mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6			10		7
3851	Carpovirusine Evo 2	Apfelwickler-Granulosevirus	Apfelwickler	0,5	1	Fruchtdurchmesser 10 mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6	6	-	10	-	-
4144	CheckMate Puffer CM	Codlemone	Apfelwickler	3 Stk. /ha		Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	1	1	Codlemone max. 1x/Jahr	-	-	-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
4416	CheckMate Puffer Leaf Multi	Tetradecenylacetat, Codlemone	Apfelwickler, Fruchtschalenwickler, Rotbrauner Schalenwickler	3 Stk. /ha		Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	1	1	-	-	-	-
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Chlorantraniliprole	Apfelwickler	0,088	0,175	Ab Fruchtdurchmesser 10 mm bis Beginn Fruchtreife	1	1	Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	-	30.04.2025	14
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3865	Delfin WG	Bacillus thuringiensis va. Kurstaki	Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Fruchtschalenwickler, Rotbrauner Schalenwickler, Apfelwickler)	17.000m² LWF*	0,75	Blühende bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6	6	max. 3 aufeinanderfolgende Anwendungen	7	-	-
3766	Ecodian CP	Codlemone	Apfelwickler	2000 Stk		Vor Beginn Falterflug	2	-	-	60	-	-
3431/1	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431/901	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3837	Harpun	Pyriproxyfen	Apfelwickler	0,5	1	Fruchtdurchmesser 10 mm bis T-Stadium (Fruchtdurchmesser 40 mm)	2	2	Pyriproxyfen max. 2x/Jahr	7	-	-
3383/901	Hinode *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2984/901	Inecor *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2827	Isomate C Plus	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol	Apfelwickler	Max. 1000 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3001	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol, Tetradecen	Apfelwickler, Schalenwickler	Max. 1000 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
2849	Isomate CTT	Codlemone, Dodecanol	Apfelwickler	Max. 500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3002	Isomate OFM rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pfirsichwickler	Max. 500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3129	Kanemite SC	Acequinocyl	Spinnmilben	0,625	1,875	Ab Rotknospenstadium bis 70% Fruchtgröße	1	1	-	-	31.12.2024	14
2875/901	Koromite	Siehe Milbeknock (2875), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
396	Kumulus WG	Schwefel	Gallmilben, freilebende Arten	2	6	Bei Befallsbeginn ab Knospenschwellen bis Ballonstadium	4	14	Schwefel max. 14x/Jahr	10	30.09.2024	-
3657	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	Fruchtschalenwickler, Brauner Obstbaumw., Rotbrauner Schalenw.	0,33	1	Ab Larvenschlupf	3	3	-	7	-	-
3316	Madex Max	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,15	Ab Larvenschlupf	6	6	-	max. 8	-	-
3592	Madex Top	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,1	Beginn Eiablage bis Larvenschlupf	6	6	Apfelwickler-Granulosevirus max. 6x/J	max. 8	-	-
3809	Madex Twin	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,1	Ab Larvenschlupf	6	6	-	6	-	-
			Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Larvenschlupf	6					
2568/902	Micula	Siehe Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat (2568), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
2875	Milbeknock	Milbemectin	Obstbaumspinnmilbe	0,625	1,875	Bei mobilen Stadien ab Blühende bis 60% Fruchtgröße	2	2	*IRAC 6; max.2x IRAC 6 pro Jahr	7	31.07.2024	14
2875/902	Milbeknock Top	Siehe Milbeknock (2875), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2620	Mimic	Tebufenozide	Apfelwickler	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf	2	3	-	14	31.05.2025	14
			Fruchtschalenwickler	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf	2					
2830	Mospilan 20 SG	Acetamiprid	Apfelwickler	0,125	-	Nach der Blüte, ab Raupenschlupf	2	2	Max. 2 Anwendungen mit Acetamiprid pro Jahr	14	-	14
			Blattläuse	0,125	-	Nach Blüte, bei Befallsbeginn	2			10		
			Birnblattsauger	0,25	-	Nach Blüte ab Larvenschlupf	1			-		
			Sägewespen	0,125	-	Unmittelbar nach Blüte (abg. Blüte)	1			-		
2830	Mospilan SG	Siehe Mospilan (2830), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021/3	Movento SC 100 *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento 100 SC *(bienengefährlich)*	Spirotetramat	Gallmücken, Blattläuse, Blutlaus, Schildläuse, Blattsauger	0,75	1,875	Nach der Blüte bis Beginn Fruchtreife	2	2	max. 2x IRAC 23 pro Jahr; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	14	30.06.2026	21
2699/901	Naturen Bio Schädlingsfrei Neem	Siehe NeemAzal-T/S (2699), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2699	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	Saugende Insekten, Beißende Insekten, Blattminierende Insekten	1,5	4,5	Ab Befallsbeginn bis Ende der Blüte	4	4	-	10	31.08.2025	-
3519	Nemapom	Entomopathogene Nematoden	Apfelwickler	1,5 Mrd.	-	Anfang September bis Dezember	1	-	-	-	-	-
2622/903	Neudosan Neu	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2622	Neudosan Neu Blattlausfrei	Fettsäuren, Kali-Seife	Blattläuse (ausgenommen Blutlaus), Blattsauger	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	-	7	31.08.2024	-
			Spinnmilben	10	30	Bei Befallsbeginn	5			7		-
2622/901	Neudosan Obst- u. Gemüse SchädlingsFrei	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4477	NEU 1153 I EC *(bienengefährlich)*	Pyrethrine	Kernobstblattlaus, Rosige Apfelfaltenblattlaus	15.000m² LWF*	1,5	Ab Grüner Knospe bis Beginn Fruchtreife	2	2	In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	3	15.06.2027	3
			Apfelblütenstecher	15.000m² LWF*	0,69	Ende Knospenschwellen bis Mausohr	2			3		3
			Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Wickler, Apfelwickler)	15.000m² LWF*	1,05	Mausohr bis Beginn Fruchtreife	2			5		3
			Rotbrauner Apfelfruchtstecher	15.000m² LWF*	1,05	Ende Knospenschwellen bis Mausohr	2			5		3

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3354	Para Sommer	Paraffinöl	Spinnmilben (ab Wintereier)	15	45	Mausohr- bis Ballonstadium	1	1	Paraffinöl max.1x/J	-	15.08.2026	-
3238	Pirimor-Granulat	Pirimicarb	Blattläuse	0,25	0,75	Nach Erreichen der Schadschwelle	3	3	Pirimicarb max.3x/J	10	Aufbrauchsfrist 08.05.2025	21
2633/903	Promanal Neu Austriebsspritzmittel	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739/901	Promanal HP	Siehe Austriebsspritzmittel 7 E (1739), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2633/902	Promanal Schild- und Wolllausfrei	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2437	RAK 3	Codlemone	Apfelwickler	500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3878	RAK 3+4	Codlemone, Tetradecylacetat	Apfelwickler, Fruchtschalenwickler	500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
4477/901	Raptol HP	Siehe NEU 1153 I EC (4477), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2568	Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat	Rapsöl	Spinnmilben, Obstbaumspinnmilbe	10	-	Bei Befallsbeginn	2	2	Wenn Spinnmilbenindikation max. 2x, sonst max. 3x	7	15.12.2025	-
			Blattläuse	10	-	Bei Befallsbeginn	3	3				
4238	SemiosNET-Codling Moth	Codlemone	Apfelwickler	2 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	Codlemone max. 1x/Jahr	-	-	-
4091	Sivanto Prime (Bienengefährlich: bei Mischung mit SSH)	Flupyradifluron	Mehlige Apfelblattlaus, Kernobstb., Rosige Apfelfaltenb., Kerbelb.	0,2	0,4	Bei Befall, von Mausohrstadium bis Vollblüte	1	1	-	-	09.12.2026	-
			Mehlige Apfelblattlaus, Kernobstb., Rosige Apfelfaltenb., Kerbelb.	0,2	0,6	Bei Befall, von Mausohrstadium bis Vollblüte	1		Anwendung des Wirkstoffes Flupyradifluron nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche			
			Apfelblattsauger	0,3	0,6	Bei Befall, von Mausohrstadium bis Vollblüte	1					
			Apfelblattsauger, Mehlige Apfelbattlaus, Rosige Apfelfaltenb., Kerbelb., Grüne Apfelblattlaus	0,3	0,9	Von Vollblüte bis 90% Fruchtgröße	1					14
			Apfelsägewespe	0,3	0,9	Von Vollblüte bis Nachblütefruchtfall	1					
			Braune Apfelwanze	0,3	0,9	Von Vollblüte bis 90% Fruchtgröße	1					
4091/2	Sivanto Prime 200 SL	Siehe Sivanto Prime (4091), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3141/903	Spruzit Progress	Siehe Spruzit Schädlingsfrei (3141), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3141	Spruzit Schädlingsfrei	Pyrethrine + Rapsöl	Apfelblütenstecher	2,3	6,9	Vor der Blüte bis Ballonstadium	2	2	-	3	31.08.2024	3
3383	Teppeki *(bienengefährlich)*	Flonicamid	Blattläuse	0,07	0,21	Bei Erreichen Schadschwelle	3	3	In/Bei blühenden Kulturen/ Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	14	31.08.2024	21
3042	Tyron	Raubmilben Stamm Mikulov	Apfelrostmilbe, Spinnmilben	1000-1500 Stk.		Jänner-Februar	1	-	-	-	-	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3984/902	Voliam *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431	XenTari	Bacillus thuringiensis var. aizawai	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	Bei Befall (Larvenstadium L1-L2)	4	4	-	8	-	5
3431/3	XenTari WG	Siehe Xentari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Zulässige Fungizide und Bakterizide (Apfel)

3450/901	Alcoban 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3398	Karma SG	Kaliumhydrogen-carbonat	Schorf Befallsminderung	2,5	5	Mausohrstadium bis Blühbeginn und Blühende bis Beginn Fruchtreife	8	8	-	7	-	1
3987	Avalon	Pyrimethanil	Schorf	0,375	1,125	Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	3	3	*Anilinopyrimidine	7	15.03.2026	56
3156	Bellis	Boscalid, Pyraclostrobin	Echter Mehltau	0,267	0,8	Ab Mausohrstadium bis Beginn Fruchtreife	4	4	*SDHI; *Strobilurine	8	31.01.2025	7
			Lagerfäulen			70% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	2					
			Schorf			70% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	4					
2994	Blossom Protect	Aureobas. pullulans	Feuerbrand Befallsminderung	0,75	2,25	Während der Blüte	5	9	-	1	31.01.2025	-
			Pilzliche Lagerfäulen, Monilia fructigena	0,5	1,5	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	4			2		
4053	Botrefin	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, ausg. Lagerschorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
3638/902	Captan Plus 80 WG	Siehe Scab 80 WG (3638), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2615	Chorus 50 WG	Cyprodinil	Schorf	0,15	0,45	Bei Infektionsgefahr bis Blühende	3	3	*Anilinopyrimidine	6	15.03.2026	-
3157	Cidely	Siehe Vegas (3157), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitzen bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.03.2026	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitzen bis Beginn Fruchtreife	14					
3404/901	Cumatol (350g Cu/kg)	Siehe Funguran progress (3404), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405/901	Cupravit (250g Cu/l)	Siehe Cuprozin Progress (3405), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/901	Cuprofor flow (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Obstbaumkrebs	1,05	2,62	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3405	Cuprozin Progress (250g Cu/l)	Kupferhydroxid	Schorf	0,25	0,75	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	8	8	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	14	-	14
				0,25	0,75	Ab T-Stadium bei Infektionsgefahr	3			14		
			Obstbaumkrebs	1	3	Nach der Ernte bei Befallsbeginn	3			21		-
			Feuerbrand	0,25	0,75	Ab Blühbeginn bis T-Stadium	3			7		-
			Kragenfäule	-	4	Bei Infektionsgefahr (Steichen oder Spritzen im Stammbereich)	3	3		7		-
3450	Delan WG: Alte Zulassung	Dithianon	Indikations-Nr. 2: Schorf	0,25	0,75	Bei Infektionsgefahr	12	12	-	5	Aufbrauchsfrist 22.07.2025	21
3450	Delan WG: Neue Zulassung	Dithianon	Schorf	0,25	0,5	Bei Infektionsgefahr, Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	3	6	-	7	31.08.2025	42
			Schorf	0,25	0,5	Bei Infektionsgefahr, Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	6		-	10		
3632	Delan pro	Dithianon, Kaliumphosphonat	Schorf	0,83	2,5	Ab Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	6	6	-	5	31.08.2025	35
3450	Delan 70 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3450/4	Delan 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3323/2	Difcor	Siehe Difcor 250 EC (3323), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3323	Difcor 250 EC	Difenoconazol	Schorf	0,067	0,2	Ab Blühbeginn bis 90% Fruchtgröße	4	4	*DMI	5	15.03.2027	14
4000	Difenofin	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Bei Infektionsgefahr ab Blühbeginn	4	4	*DMI	5	15.03.2027	28
3285	Difenzone	Difenoconazol	Schorf	0,067	0,2	Ab 10 mm Fruchtdurchmesser bis 90% Fruchtgröße	4	4	*DMI; Difenoconazol max. 4x/J	10	31.12.2024	21
4421	Difol	Difenoconazol, Folpet	Apfelschorf	17.000m² LWF*	3,5	Rotknospenstadium bis 80% Fruchtgröße	3	3	*DMI; *FRAC M04; Difenoconazol bzw. Folpet max. 4x/J	10	31.07.2024	110
4136	Disco	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	15.03.2027	28
3591	Faban	Dithianon + Pyrimethanil	Schorf	0,4	1,2	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	4	4	*Anilinopyrimidine	8	31.08.2025	56
3275	Fatizol 100 EC	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2758	Flint	Trifloxystrobin	Echter Mehltau	0,05	0,1	Bei Befallsbeginn	3	3	*Strobilurine; Trifloxystrobin max. 3x/J	10	-	14
			Pilzliche Lagerfäulen			Vor der Ernte	3			10		
			Schorf			Bei Infektionsgefahr	3			7		
3034	Flowbrix (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Obstbaumkrebs	1,05	2,62	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	--

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3034/4	Flowbrix Trace (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404	Funguran Progress (350g Cu/kg)	Kupferhydroxid	Schorf	0,3	0,9	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	-
			Schorf	0,3	0,9	Bei Infektionsgefahr, ab T-Stadium	3			7		14
			Obstbaumkrebs	1	3	Nach der Ernte bei Befallsbeginn	3			21		-
3528	Geoxe	Fludioxonil	Pilzliche Lagerfäulen (ausg. Schorf)	0,15	0,45	Ab T-Stadium bis Beginn Fruchtreife	2	2	-	7	31.10.2024	3
3399	Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	Schorf Befallsminderung	2,5	5	Mausohrstadium bis Blühbeginn + Blühende bis Beginn Fruchtreife	6	6	Max. Anwendungs-konzentration 1%	7	-	1
			Fliegenschmutz	2,5	5	20 mm Fruchtdurchm. bis Beginn Fruchtreife	6			8		1
396	Kumulus WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	Schwefel max. 14x/Jahr	7	30.09.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14			7		
3034/5	KUPFER 380 RK (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4401	Laitane	Pyrimethanil	Apfelschorf	16.000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
3973	Luna Care	Fluopyram, Fosetyl	Schorf	1	3	Knospenschwellen bis Mausohr	3	3	*SDHI; keine Anwendung bei Golden Delicius und deren Mutanten; max. 3 Anwendungen mit SDHI´s pro Jahr; max.2 aufeinanderfolgende Anwendungen von SDHI´s	7	15.03.2026	28
						Fruchtdurchmesser 10mm bis Beginn Fruchtreife						
			Feuerbrand			Knospenschwellen bis Mausohr						
						Fruchtdurchmesser 10mm bis Beginn Fruchtreife						
			Echter Mehltau			Knospenschwellen bis Mausohrstadium						
						Fruchtdurchmesser 10mm bis Beginn Fruchtreife						
3655/901	Luna Experience SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3655	Luna Veggie	Fluopyram, Tebuconazole	Echter Mehltau	0,125	0,375	Grünknospenstadium bis 50% Fruchtgröße	2	Nur eine Variante erlaubt	Max. 0,75l Produkt/ha/Jahr, keine weiteren Behandlungen mit Tebuconazol	7	30.06.2027	14
			Schorf	0,25	0,75	Grünknospenstadium bis 50% Fruchtgröße	1			-		
			Lagerkrankheiten	0,25	0,75	60% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	1					
3074	Malvin WG	Captan	Schorf	0,625	1,875	Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	15.11.2025	14
3255	Mavita 250 SC	Siehe Score (3255), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3820	Merpan 48 SC	Captan	Schorf	1	3	Bei Infektionsgefahr	5	5	Captan max. 5x/J	7	15.11.2025	21
2803	Merpan 80 WDG	Captan	Pilzliche Lagerfäulen	0,75	2,25	10 mm Fruchtdurchmesser bis Beginn Fruchtreife	3	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	4	31.05.2024	21
			Schorf	0,63	1,88	Ab Knospenaufbruch, bei Infektionsgefahr	5			7		
4187	Merplus	Captan, Kaliumphosphonat	Apfelschorf	0,8	2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	8	8	-	15	31.07.2024	28
3701	Microthiol WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,67	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.12.2024	7
			Schorf	2,67	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
4103	Molina	Tetraconazol	Schorf	9.800m² LWF*	0,4	Rotknospenstadium bis Beginn Fruchtreife	3	3	*DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI´s pro Jahr	10	31.12.2024	14
			Echter Mehltau	9.800m² LWF*	0,4	Rotknospenstadium bis Beginn Fruchtreife	3					
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.03.2026	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
2915	Netzschwefel Stulln	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	30.09.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
2915/901	Netz-Schwefelit WG	Siehe Netzschwefel Stulln (2915), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2059	Nimrod EC	Bupirimate	Apfelmehltau	15.000m² LWF*	0,75	Rotknospenstadium bis Blühbeginn und Blühende bis Wachstum abgeschlossen	4	4	max. 4x Bupirimate/Jahr	10	31.08.2025	14
3157/901	Nissovin	Siehe Vegas (3157), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3962	Pomax	Pyrimethanil + Fludioxonil	Bitterfäule, Grauschimmel, Fruchtmonilia (bei allen nur zur Befallsminderung)	0,64	1,6	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
4399	Pretil	Pyrimethanil	Apfelschorf	16.000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
4366	Pyramid	Pyrimethanil	Schorf	0,45	1,125	Ab Knospenaufbruch bis Nachblütefruchtfall	3	3	*Anilinopyrimidine; max. 4x Anilinopyrimidine pro Jahr	5	30.04.2024	56
4400	Pyrogal	Pyrimethanil	Apfelschorf	16.000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
2997	Pyrus	Pyrimethanil	Schorf	0,33	1	Knospenaufbruch bis Blühende	3	3	*Anilinopyrimidine; Pyrimethanil max. 3x/Jahr	7	30.04.2024	56
3366	Regalis Plus (100g/kg)	Prohexadion-Calcium	Feuerbrand- Sekundärinf.	0,83	2,5	Während Blüte (1.Anwendungsfenster)	5	6	Prohexadion-Calcium max. 6x/Jahr, in Summe max. 300g WS / ha und Jahr	-	31.12.2024	55
			Feuerbrand- Sekundärinf.	0,5	1,5	10 mm Fruchtdurchmesser bis 50% Fruchtgröße (2.Anwendungsfenster)	3					

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
4287	Revyona	Mefentrifluconazole	Apfelschorf, Birnenschorf, Apfelmehltau (befallsmindernd)	15.000m² LWF*	2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	2	Var. 1 oder Var. 2 wählen	*DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI´s pro Jahr	7	20.03.2030	28
			Apfelschorf, Birnenschorf, Apfelmehltau (befallsmindernd)	18.000m² LWF*	2,34	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	1			-		
3578/901	Sanax	Siehe VitiSan (3578), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4398	Erune 40 SC	Pyrimethanil	Apfelschorf	16.000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
3938	Scab 480 SC	Captan	Schorf	1,04	3,125	Ende Blüte bis T-Stadium	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	15.11.2025	21
3638	Scab 80 WG	Captan	Schorf	0,63	1,88	Ab Knospenaufbruch	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	31.07.2023	21
3064	Scala	Pyrimethanil	Schorf	0,375	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	3	3	*Anilinopyrimidine; max. 4x Anilinopyrimidine pro Jahr	7	30.04.2024	56
			Grauschimmel, Bitterfäule, Monilia-Fruchtfäule	15.000m² LWF*	1,5	90% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	3			10		7
3255	Score	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn, bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	31.12.2024	28
4001	Sekvenca	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn, bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	31.12.2024	28
3796	Sercadis	Fluxapyroxad	Schorf	0,08	0,25	Ab Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	3	3	*SDHI	7	31.05.2026	35
3536	Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	Feuerbrand (nur bedingt wirksam)	2,67	8	Blühbeginn bis 90% Fruchtgröße, bei Infektionsgefahr	6	6	-	3	-	-
3074/901	Sigma 80 WG	Siehe Malvin WG (3074), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.07.2024	
4378	Sinclaire	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
4103	Smaragd	Siehe Molina (4103), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4306	Society	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Bei Infektionsgefahr, Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	31.10.2024	3
4355	Speech	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
3157	Star Cyflufenamid	Siehe Vegas (3157), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3275	Star Penconazol	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2576	Stroby	Kresoxim-methyl	Apfelschorf	0,067	0,2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife, bei Infektionsgefahr	3	3	*Strobilurine; max. 3x Strobilurine/ Jahr, keine aufeinanderfolgenden Anwendungen mit Strobilurinen	7	31.12.2025	28
2619	Switch	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	31.07.2024	3
2889	Talendo	Proquinazid	Echter Mehltau	22.500m² LWF*	0,375	Mausohrstadium bis 50% Fruchtgröße	3	3	Keine aufeinanderfolgenden Anwendungen	14	31.07.2024	49

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.07.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
3275	Topas	Penconazol	Echter Mehltau	0,125	0,375	Ab Blühbeginn, bei Befallsbeginn	3	3	*DMI; Penconazol max. 3x/J	6	31.12.2026	14
3528	Treso	Siehe Geoxe (3528), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3157	Vegas	Cyflufenamid	Apfelmehltau	0,17	0,5	Erste Laubblätter volle Größe bis Beginn Fruchtreife	2	2	-	7	31.03.2024	21
3578	VitiSan	Kaliumhydrogen-carbonat	Schorf	2,5	7,5	Mausohrstadium bis Beginn Fruchtreife	6	6	-	3	-	-
3034/6	Zetaram Plus	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Zulässige Herbizide (Apfel)

2928	Agil-S	Propaquizafop	Einjährige 1-keimblättrige Unkräuter, ausgenommen einjährige Rispe	-	0,75	Nach dem Auflaufen der Ungräser	1	1	-	-	30.11.2024	30
			Quecke	-	1,5	Nach dem Auflaufen der Quecke	1					
2928	Agil 100 EC	Siehe Agil-S (2928), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691/2	Agro Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	Agro MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/901	Barbarian Super 360 (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768	Beloukha	Pelargonsäure	Wurzelschosser	-	16	Während der Vegetationsperiode	2	2	-	14	31.08.2024	-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Während der Vegetationsperiode	2			14		-
2948	Boom efekt (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1 und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	-	35
2798/902	Campus	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/902	Clinic Grade (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.06.2024	
3526/901	Clinic TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Durano (3526), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 30.06.2024	
4467	Clinic Xtreme (540g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J		15.12.2024	
3052	Dicopur M	MCPA	Ackerkratzdistel, Ackerwinde	-	2	Frühjahr und Sommer, ab 1. Standjahr	2	-	-	60	31.10.2024	-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3526	Durano (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer (während der Vegetationsperiode), ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	-	15.12.2024	42
4406	Durano SL (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, ab dem Pflanzjahr	-	3	Frühjahr bis Sommer	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	28	15.12.2024	28
3526/904	Durano TF(360g/l Glyphosate)	Siehe Durano (3526), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Flexidor	Isoxaben	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	-	1	Frühjahr-Vorblüte, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	31.12.2024	-
3964	Frequent	Fluazifop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	-	1	Während der Vegetationsperiode	1	1	-	-	31.12.2024	28
			Quecke		2	Während der Vegetationsperiode	1			-		
2790	Fusilade MAX	Fluazifop-P	Einjährige 1-keimblättrige Unkräuter, ausgenommen einjährige Rispe	-	1	Bis Reifebeginn	1	-	-	-	31.12.2024	28
			Quecke	-	2	Bis Reifebeginn	1			-		
3630	Gallup Biograde 360 (360g/l Glyphosat) (*Bienengefährlich*)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	-	15.12.2024	-
4473	Glister Ultra (360g/l Glyphosat)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Herbst nach Laubfall oder Frühjahr vor Austrieb, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	16.12.2024	-
2651	Glyfos (360g/l Glyphposat)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	Aufbrauchsfrist 15.12.2025	42
3631	Glypho-Rapid 450 (450g/l)	Glyphosate	Einjährige 1- und 2-keimblättrige Samenunkräuter	-	3,2	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 1x/Jahr	-	15.12.2024	-
2948/902	Glyphoxx 360 TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798/901	Grometa	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2907	Kabuki	Pyraflufen-ethyl	Wurzelschosser	-	0,8	Ab dem 2. Standjahr	2	-	-	14	-	-
3768/901	Kalina	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768/902	Katamisa	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3215	Kerb Flo	Propyzamid	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	6,25	Winter/ Vegetationsruhe, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	-	-
2948/901	Landmaster 360 TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948)										
4139	Naprop 450	Napropamid	Einjähr. 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Nach dem Pflanzen und vor dem Auflaufen der Unkräuter	1	1	Nur in Junganlagen, Baumschulen	-	Aufbrauchsfrist 31.12.2024	-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3599	Nasa (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Ab Pflanzjahr, Frühjahr oder Sommer	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
2798/2	Orefa Di-Amide-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Rodixelf	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2948/903	Rosate Clean 360 (360 g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4471	Roundup Future (500g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	2,4	Frühajhr bis Sommer	3	3	Glyphosate max. 3x/J, max. 3600gWS/ha/J; max. 50% der Fläche behandeln	28	15.03.2024	-
3437	Roundup PowerFlex (480g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	3,33	Frühjahr oder Sommer	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
3692	Shyfo (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
2798	Spectrum	Dimethenamid-p	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter, einj. Rispe, Hirse-Arten	-	1,4	Bis T-Stadium oder Nachernte, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	-	-
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	Star Dimethenamid-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	STAR Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	STAR MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3014	Taifun forte (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Während Vegetationsperoide, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
2809	Touchdown Quattro (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, außer Ackerwinde	-	4	Während Vegetationsperoide, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
3014/1	Turbo Glyphos (360 g/l Glyphosate)	Siehe Taifun forte (3014), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/1	Vidia (360 g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2809/901	Vorox Unkrautfrei Direkt (360 g/l Glyphosate)	Sehe Touchdown Quattro (2809), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2928/901	Zetrola	Siehe Agil-S (2928), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
Wachstumsregler, Fruchtausdünnmittel, Mittel zur Förderung der Blütenbildung und zur Verhinderung der Berostung (Apfel)												
4021	Amidir (28g WS/kg)	Naphthyl-1-essigsäure amid	Fruchtausdünnung	10.400m² LWF*	3,214	Abgehende Blüte bis Ende Blüte	1	1	-	-	31.12.2024	30
3661	Brevis	Metamitron	Fruchtausdünnung	0,73	2,2	Blühende bis Fruchtdurchmesser 20mm	1	1	-	-	30.11.2027	60
3272	Cerone	Etephon	Ausdünnung, Förderung Blütenbildung	0,1	0,3	Ballonstadium bis Blühbeginn	2	2	-	-	15.11.2025	10
				0,1	0,3	Fruchtdurchmesser 20mm bis 2.Fruchtfall	2					
3272/1	Cerone 660	Siehe Cerone (3272), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4380	Cube	Gibberellinsäure	Förderung Fruchtgröße u. Fruchtansatz	2 Tabl.	5 Tabl.	Blühbeginn bis Blühende	1	1	-	-	31.08.2024	-
3889	Dirabel (84,67g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.600m² LWF*	0,24	Ab Beginn Fruchtreife	2	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	7	31.12.2024	7
			Fruchtausdünnung	10.500m² LWF*	0,24	Blühende bis 10mm Fruchtdurchmesser	1			-		7
4020	Dirager (37g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.400m² LWF*	0,541	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	2	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	7	31.12.2024	7
			Fruchtausdünnung	10.300m² LWF*	0,541	Blühende bis 10mm Fruchtdurchmesser	1			-		7
3891	Diramid (80g WS/kg)	Naphthyl-1-essigsäure amid	Fruchtausdünnung	10.400m² LWF*	1,125	Abgehende Blüte bis Ende Blüte	1	1	-	-	31.12.2024	30
3335	Exilis	6-Benzylaldenin	Fruchtausdünnung, Förderung Fruchtgröße	3,75	7,5	10 - 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	6-Benzyladenin max. 1x/Jahr	-	31.08.2025	-
4779	Exilis 100 SC	6-Benzylaldenin	Fruchtausdünnung, Förderung Fruchtgröße	0,75	1,5	10 - 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	6-Benzyladenin max. 1x/Jahr	-	31.05.2025	-
3899	Fixor (100g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	0,06	0,15	Ab Beginn Fruchtreife	2	2	-	7	01.10.2025	7
			Fruchtausdünnung	0,07	0,15	Bis 10mm Fruchtdurchmesser	1	1		-		-
4389	Frooti (77,8g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Fruchtausdünnung	0,17l/ 10.000m²LWF		Blühende bis 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	-	-	31.12.2024	-
4022	Fruit Auxin 30 SL (30,2g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.800m² LWF*	0,662	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	2	3	-	7	31.12.2024	7
			Fruchtausdünnung	10.400m² LWF*	0,662	Blühende bis 10mm Fruchtdurchmesser	1			-		7
3549	Fruitone (80g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Fruchtausdünnung	0,083	0,25	Abgehende Blüte bis Fruchtdurchmesser 20mm	1	2	Naphthyl-1-essigsäure max. 2x/Jahr	-	01.08.2026	-
			Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	0,083	0,25	Vor der Ernte	2			7		7

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Apfel

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3279	Gibb plus	Gibberelline GA4+GA7	Minderung Fruchtberostung	0,5	1,5	Abgehende Blüte	4	4	-	10	15.07.2026	-
3434	Globaryll 100	6-Benzyladenin	Fruchtausdünnung	0,75	2,25	10- 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	-	-	31.08.2025	-
3827	Kudos (100g WS/kg)	Prohexadion-Calcium	Hemmung des Triebwachstums	0,625	1,25	Blühbeginn bis 50% Fruchtgröße	2	2	Prohexadion-Calcium in Summe max. 300g WS / ha und Jahr	21	31.12.2024	55
3419	MaxCel	6- Benzyladenin	Fruchtausdünnung	3,75	7,5	7- 15mm Fruchtdurchmesser	1	1	-	-	31.08.2025	-
4383	Monex (10g WS/kg)	1-Naphthylessigsäure	Fruchtausdünnung	12.500m² LWF*	1,5	Blühende bis 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	-	-	31.12.2024	-
			Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	15.000m² LWF*	1,5	Nachblütefruchtfall bis Beginn Fruchtreife	1			-		7
3469	Novagib	Gibberelline GA4+GA7	Minderung Fruchtberostung	0,2	0,6	Ab Blühende bis 2. Fruchtfall	5	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	7	15.07.2026	-
				0,25	0,75	Ab Blühende bis 2. Fruchtfall	4			10		
4220	Promalin	6-Benzyladenin Gibberelline GA4+GA7	Förderung der Fruchtgröße Minderung der Fruchtberostung	0,32	0,8	Vollblüte bis zweier Fruchtfall	4	4	-	7	31.08.2024	-
3366	Regalis Plus (100g WS/kg)	Prohexadion-Calcium	Hemmung des Triebwachstums	0,83	2,5	Während Blüte (1.Anwendungsfenster)	5	6	Prohexadion-Calcium max. 6x/ Jahr, in Summe max. 300g WS / ha und Jahr	-	31.12.2024	55
				0,5	1,5	10 mm Fruchtdurchm. bis 50% Fruchtgröße (2.Anwendungsfenster)	3			-		
3400	Regulex 10 SG	Gibberellin GA4+GA7	Minderung der Fruchtberostung	0,025	0,15	Von 50% der Blüten geöffnet bis 2.Fruchtfall	4	4	-	7	31.08.2025	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg(l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen mit Produkt	Wirkstoff(-gruppen) Einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
Rodentizide, Wildverbissmittel (Apfel)												
4167	Arvalin	Zinkphosphid	Feldmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
				50g/ Köderst.	2	Bei Bedarf	3		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
4142	Arvalin Forte	Zinkphosphid	Feldmaus	4 Pellets pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
4101	Arvalin Phos	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	1 Tablette/8-10m Ganglänge		Bei Befall	4	4	Köder*	7	31.08.2024	-
3011	Certosan	Blutmehl	Verbiss durch Rehwild/ Hasen	s. Zul.	20kg/ha	Frühjahr bis Sommer oder Herbst	2	2	-	28	31.03.2037	-
4218	Delu Wühlmausgas	Calciumcarbid	Wühlmaus	5g pro Loch		Bei Befall	-	-	Verdecktes Auslegen in Gänge/Löcher	-	31.08.2024	-
			Maulwurf	20g pro Loch		Bei Befall	-	-				
2703/902	Detia Wühlmausköder Neu	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4167/901	Giftweizen Arvastop	Siehe Arvalin (4167), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3770	Quickphos Pellets WM	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	5-10 Pellets/Gang			1	1	Köder*	-	30.11.2027	-
4088	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
				100g / Köderst.	2,5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3975	Ratron Giftweizen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
3937	Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid	Wühlmaus	1 Köder/ 5m Gang	5	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	30.04.2025	-
				1 Köder/ Köderst.	5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3364	Wöbra	Quarzsand	Schäl- und Nageschutz gegen Feldhasen	250 g/Stamm		Ganzjährig	1	1	Quarzsand max. 1x /J	-	-	-
2703	Wühlmausköder	Zinkphosphid	Wühlmaus	5g je 8m Gang		Ganzjährig, bei Befall	1	-	Köder*	-	31.12.2024	-
2703/903	Wühlmaus-Köder	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2703/901	Wühlmausköder Arrex	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										