Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen

***Erklärungen:**

Köder	Mittel muss tief und unzugänglich für Vögel und Säugetiere in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Mittel an der Oberfläche zurückbleiben!
LWF	Max. mögliche Fläche bei Dosierung nach Laubwandfläche. Aufwandmenge nach LWF (Laubwandfläche) berechnen
SDHI (FRAC 7)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den SDHI´s: Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyrazam
DMI (FRAC 3)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den DMI´s (SSH): Difenoconazol, Penconazol, Tebuconazol, Tetraconazol, Myclobutanil, Mefentrifluconazol
Anilinopyrimidine	Folgende Wirkstoffe gehören zu den Anilinopyrimidinen: Cyprodinil, Mepanipyrim, Pyrimethanil
Strobilurine (FRAC 11)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den Strobilurinen: Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Kresoxim-methyl, Trifloxystrobin
FRAC M04	Folgende Wirkstoffe gehören zur FRAC M04 Gruppe: Captan, Folpet
IRAC 6	Folgende Wirkstoffe gehören zur IRAC 6 Gruppe: Abamectin, Emamectin benzoate, Milbemectin

Zulässige Insektizide und Akarizide (Birne)

3550	Acorit 250 SC	Hexythiazox	Spinnmilben (Eier u. Larven)	0,13	0,4	Knospenschwellen bis Beginn Fruchtreife	1	1	Hexythiazox oder Clofentezine max. 1x/J	-	31.08.2024	28
4080	Affirm Opti *(bienengefährlich)*	Emamectin	Apfelwickler	0,69	2,06	Fruchtdurchmesser 10mm bis Beginn Fruchtreife	3	3	*IRAC 6;Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	7	30.04.2025	7
3383	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383/902	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Ende Knospenschwellen bis Mausohrstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/ J	-	31.12.2024	-
2633	Austriebsspritzmittel Promanal Neu	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Beginn Knospenschwellen bis Grünknospenstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/ J	-	31.12.2024	-
			Schildläuse (überwinternde Stadien)	10	30	Beginn Knospenschwellen bis Grünknospenstadium	1			-		-
3968	Bactospeine DF	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	Freifressende Schmetterlingsraupen	15000m² LWF*	1,5	Ab Schlüfen der ersten Larven von Rotknospenstadium b. 80% Fruchtgröße	8	8	-	7	-	-
2622/902	biohelp Neudosan	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2633/904	biohelp Promanal	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
3468	Capex 2	Schalenwickler-Granulosevirus	Schalenwickler	0,05	0,15	Bei Befall bis Ballonstadium	2	4	-	-	Aufbrauchsfrist 01.07.2024	-
			Schalenwickler (Sommergeneration)	0,05	0,15	Bei Befall	2			-		-
2570	Carpovirusine	Apfelwickler-Granulosevirus	Apfelwickler	12.500m² LWF*	1	Fruchtdurchm. 10mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6	6	AW-Granulosevirus max. 6x/J	10	-	7
			Pfirsichwickler	12.500m² LWF*	1	Fruchtdurchm. 10mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6			10		7
3851	Carpovirusine Evo 2	Apfelwickler-Granulosevirus	Apfelwickler	0,5	1	Fruchtdurchm. 10mm bis Beginn Fruchtreife, ab Larvenschlupf	6	6	-	10	-	-
4144	CheckMate Puffer CM	Codlemone	Apfelwickler	3 Stk. /ha		Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	1	1	Codlemone max.1x/Jahr	-	-	-
4416	CheckMate Puffer Leaf Multi	Tetradecenylacetat, Codlemone	Apfelwickler, Fruchtschalenwickler, Rotbrauner Schalenwickler	3 Stk. /ha		Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	1	1	-	-	-	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Chlorantraniliprole	Apfelwickler	0,088	0,175	Ab Fruchtdurchmesser 10mm bis Beginn Fruchtreife	1	1	Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	-	30.04.2025	14
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Birnenpockenmilbe	1,5	4,5	Vor der Blüte	2	14	-	7	31.03.2026	-
3865	Delfin WG	Bacillus thuringiensis va. Kurstaki	Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Fruchtschalenwickler, Rotbrauner Schalenwickler, Apfelwickler)	17.000m² LWF*	0,75	Blühende bis Beginn Fruchtreife	6	6	max. 3 aufeinanderfolgende Anwendungen	7	-	-
3431/1	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431/901	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3837	Harpun	Pyriproxyfen	Birnblattsauger	0,5	1	Knospenaufbruch bis Blühende	1	1	Pyriproxyfen max. 2x/J	-	-	-
3383/901	Hinode *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2984/901	Inecor *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2827	Isomate C Plus	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol	Apfelwickler	Max. 1000 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3001	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol, Tetradecen	Apfelwickler, Schalenwickler	Max. 1000 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
2849	Isomate CTT	Codlemone, Dodecanol	Apfelwickler	Max. 500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3002	Isomate OFM rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pfirsichwickler	Max. 500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
3129	Kanemite SC	Acequinocyl	Spinnmilben	0,625	1,875	Ab Rotknospenstadium bis 70% Fruchtgröße	1	1	-	-	31.12.2024	14
2875/901	Koromite	Siehe Milbeknock (2875), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3399	Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	Birnblattsauger	-	4,5	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	8	8	-	7	-	1
396	Kumulus WG	Schwefel	Gallmilben	2	6	Knospenschwellen bis Ballonstadium	4	14	Schwefel max. 14x/Jahr	10	30.09.2024	-
3657	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Fruchtschalenwickler, Brauner Obstbaumw., Rotbrauner Schalenw.	0,33	1	Ab Larvenschlupf	3	-	-	7	-	-
3316	Madex Max	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,15	Ab Larvenschlupf	6	6	-	max. 8	-	-
3592	Madex Top	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,1	Beginn Eiablage bis Larvenschlupf	6	6	Apfelwickler- Granulosevirus max. 6x/J	max. 8	-	-
3809	Madex Twin	Apfelwickler Granulosevirus	Apfelwickler	0,05	0,1	Ab Larvenschlupf	6	6	-	6	-	-
			Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Larvenschlupf	6			6		
2568/902	Micula	Siehe Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat (2568), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
2875	Milbeknock	Milbemectin	Obstbaumspinnmilbe	0,625	1,875	Bei mobilen Stadien ab Blühende bis 60% Fruchtgröße	2	2	*IRAC 6; max.2x IRAC 6 pro Jahr	7	31.07.2024	14
2875/902	Milbeknock Top	Siehe Milbeknock (2875), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2620	Mimic	Tebufenozide	Apfelwickler	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf	2	3	-	14	31.05.2025	14
			Fruchtschalenwickler	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf	2					
2830	Mospilan 20 SG	Acetamiprid	Apfelwickler	0,125	-	Nach der Blüte ab Raupenschlupf	2	2	Max. 2 Anwendungen mit Acetamiprid pro Jahr	14	-	14
			Blattläuse	0,125	-	Nach Blüte bei Befallsbeginn	2			10		
			Birnblattsauger	0,250	-	Nach Blüte ab Larvenschlupf	1			-		
			Sägewespen	0,125	-	Unmittelbar nach Blüte (abg. Blüte)	1			-		
2830	Mospilan SG	Siehe Mospilan (2830), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021/3	Movento SC 100 *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento 100 SC (*bienengefährlich*)	Spirotetramat	Gallmücken, Blattläuse, Schildläuse, Blattsauger	0,75	1,875	Nach der Blüte bis Beginn Fruchtreife	2	2	max. 2x IRAC 23 pro Jahr; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	14	30.06.2026	21
3519	Nemapom	Entomopathogene Nemathoden	Apfelwickler	1,5 Mrd.	-	Anfang September bis Dezember	1	-	-	-	-	-
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Birnenpockenmilbe	1,5	4,5	Vor der Blüte	2	14	-	7	31.03.2026	-
2622/903	Neudosan Neu	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2622	Neudosan Neu Blattlausfrei	Kali-Seife	Blattläsue (ausg. Blutlaus), Blattsauger	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	-	7	31.08.2024	-
			Spinnmilben	10	30	Bei Befallsbeginn	5			7		-
2622/901	Neudosan Obst- u. Gemüse SchädlingsFrei	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622)										
4477	NEU 1153 I EC *(bienengefährlich)*	Pyrethrine	Blattläuse (ausg. Blutlaus, Grüne Zitrus-Blattlaus, Mehlige Apfelblattlaus)	15.000m² LWF*	1,5	Ab Grüner Knospe bis Beginn Fruchtreife	2	2	In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	7	15.06.2027	3
			Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Wickler, Apfelwickler)			Mausohr bis Beginn Fruchtreife	2			5		3
			Birnenknospenstecher, Rotbrauner Apfelfruchtstecher			Ende Knospenschwellen bis Mausohr	2			5		3
3354	Para Sommer	Paraffinöl	Spinnmilben (ab Wintereier)	15	45	Mausohr- bis Ballonstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/ J	-	15.08.2026	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3238	Pirimor-Granulat	Pirimicarb	Blattläuse	0,25	0,75	Nach Erreichen der Schadschwelle	3	3	Pirimicarb max.3x/ J	10	Aufbrauchsfrist 08.05.2025	21
2633/903	Promanal Neu Austriebsspritzmittel	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739/901	Promanal HP	Siehe Austriebsspritzmittel 7 E (1739), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2633/902	Promanal Schild- und Wolllausfrei	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2437	RAK 3	Codlemone	Apfelwickler	500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	Max.1 Anwendung pro Vegetationsperiode	-	-	-
3878	RAK 3+4	Codlemone, Tetradecylacetat	Apfelwickler, Fruchtschalenwickler	500 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	-	-	-	-
4477/901	Raptol HP	Siehe NEU 1153 I EC (4477), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2568	Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat	Rapsöl	Spinnmilben, Obstbaumspinnmilbe	10	-	Bei Befallsbeginn	2	2	Wenn Spinnmilbenindikat. max. 2x, ansonsten max. 3x	7	15.12.2025	-
			Blattläuse	10	-	Bei Befallsbeginn	3	3				-
			Gallmilben	10	-	Bei Befallsbeginn	3					-
4238	SemiosNET-Codling Moth	Codlemone	Apfelwickler	2 Stk./ha		Vor Beginn Falterflug	1	1	Codlemone max. 1x/Jahr	-	-	-
4091	Sivanto Prime (Bienengefährlich: bei Mischung mit SSH)	Flupyradifuron	Birnblattsauger, Gemeiner Birnblattsauger	0,3	0,9	Mausohr bis Vollblüte	1	1	Anwendung des Wirkstoffes Flupyradifuron nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche	-	09.12.2026	-
			Grüne Birnentaschengallenlaus, Mehlige Birnenblattlaus, Kernobstblattl., Braune Birnenblattl.	0,2	0,6	Mausohr bis Vollblüte	1					
			Mehlige Birnenblattlaus, Grüne Apfelblattlaus, Grüne Zitrusblattlaus, Braune Birnenblattlaus	0,3	0,9	Vollblüte bis 90% Fruchtgröße	1					14
4091/2	Sivanto Prime 200 SL	Siehe Sivanto Prime (4091), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4200	Surround WP Crop Protectant	Aluminiumsilikat (Kaolin)	Birnblattsauger	10kg/ 10.000m^2 LWF		Knospenschwellen bis Blühende	5	5	Kaolin max. 5x/ Jahr	7	15.12.2025	-
3383	Teppeki (*bienengefährlich*)	Flonicamid	Blattläuse	0,07	0,21	Bei Erreichen Schadschwelle	3	3	In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	14	31.12.2024	21
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Birnenpockenmilbe	1,5	4,5	Vorblüte	2	14	-	7	31.07.2024	-
3042	Tyron	Raubmilben Stamm Mikulov	Apfelrostmilbe, Gemeine Spinnmilbe, Obstbaumspinnmilbe	1000-1500 Stk.		Jänner-Februar, vorbeugend oder bei Befall	1	-	-	-	31.12.2036	-
3984/902	Voliam *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431	XenTari	Bacillus thuringiensis var. Aizawai	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	Bei Befall (Larvenstadium L1-L2)	4	4	-	8	-	5
3431/3	XenTari WG	Siehe Xentari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Zulässige Fungizide und Bakterizide (Birne)

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3450/901	Alcoban 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3987	Avalon	Pyrimethanil	Schorf	0,375	1,125	Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	3	3	*Anilinopyrimidine	7	15.03.2026	56
3156	Bellis	Boscalid, Pyraclostrobin	Echter Mehltau	0,267	0,8	Ab Mausohrstadium bis Beginn Fruchtreife	4	4	*SDHI; *Strobilurine	8	31.01.2025	7
			Lagerfäulen			70% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	2					
			Schorf			70% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	4					
2994	Blossom Protect	Aureobasidium pullulans	Feuerbrand Befallsminderung	0,75	2,25	Während der Blüte	5	9	-	1	31.01.2025	-
			Pilzliche Lagerfäulen, Monilia fructigena	0,5	1,5	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	4			2		
4053	Botrefin	Cyprodinil + Fludioxonil	Lagerkrankheiten außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
3638/901	Captan plus 80 WG	Siehe Scab 80 WG (3638), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 06.03.2024	
3638/902	Captan Plus 80 WG	Siehe Scab 80 WG (3638), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2615	Chorus 50 WG	Cyprodinil	Schorf	0,15	0,45	Bei Infektionsgefahr bis zum Ende der Blüte	3	3	*Anilinopyrimidine	6	15.03.2026	-
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.03.2026	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
3404/901	Cumatol (350g Cu/l)	Siehe Funguran Progress (3404), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405/901	Cupravit (250g Cu/l)	Siehe Cuprozin Progress (3405), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/901	Cuprofor flow (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Obstbaumkrebs	1,05	2,62	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	-
			Bakterielle Schaderreger	1,05	2,62		4			7		
3405	Cuprozin Progress (250g Cu/l)	Kupferhydroxid	Schorf	0,25	0,75	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	8	8	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	14	-	14
				0,25	0,75	Ab T-Stadium	3			14		
			Obstbaumkrebs	1	3	Nach der Ernte bei Befallsbeginn	3			21		-
			Feuerbrand	0,25	0,75	Ab Blühbeginn bis T-Stadium	3			7		-
			Kragenfäule	-	4	Bei Infektionsgefahr (Steichen und Spritzen im Stammbereich)	3	3		7		-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Birne

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3450	Delan WG: Alte Zulassung	Dithianon	Indikations-Nr. 3: Schorf	0,25	0,75	Bis Vollblüte	4	12	-	5	Aufbrauchsfrist 22.07.2025	21
			Indikations-Nr. 4: Schorf	0,25	0,75	Ab Vollblüte	8			5		
3450	Delan WG	Dithianon	Birnenschorf	0,25	0,5	Bei Infektionsgefahr, Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	6	6	-	10	31.08.2025	42
			Birnenschorf	0,25	0,5	Bei Infektionsgefahr, Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	3			7		
3632	Delan pro	Dithianon, Kaliumphosphonat	Schorf	0,83	2,5	Ab Knospenaufbruch bis Beginn der Fruchtreife	6	6	-	5	31.08.2025	35
3450/1	Delan 70 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3450/4	Delan 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3323/2	Difcor	Siehe Difcor 250 EC (3323), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3323	Difcor 250 EC	Difenoconazol	Schorf	0,067	0,2	Ab Blühbeginn bis 90% Fruchtgröße	4	4	*DMI	5	15.03.2027	14
4421	Difol	Difenoconazol, Folpet	Birnenschorf	17.000m² LWF*	3,5	Rotknospenstadium bis 80% Fruchtgröße	3	3	*DMI; *FRAC M04; Difenoconazol bzw. Folpet max. 4x/J	10	31.07.2024	110
4136	Disco	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	15.03.2027	28
3591	Faban	Dithianon + Pyrimethanil	Schorf	0,4	1,2	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	4	4	*Anilinopyrimidine	8	31.08.2025	56
3275/3	Fatizol 100 EC	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2758	Flint	Trifloxystrobin	Echter Mehltau	0,05	0,1	Bei Befallsbeginn	3	3	*Strobilurine; Trifloxystrobin max. 3x/J	10	-	14
			Pilzliche Lagerfäulen			Vor der Ernte	3			10		
			Schorf			Bei Infektionsgefahr	3			7		
3034	Flowbrix (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Obstbaumkrebs	1,05	2,62	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	-
			Bakterielle Schaderreger	1,05	2,62		4			7		
3034/4	Flowbrix Trace (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404	Funguran Progress (350g Cu/kg)	Kupferhydroxid	Schorf	0,3	0,9	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	-	-
			Schorf	0,3	0,9	Ab T-Stadium, bei Infektionsgefahr	3			7		14
			Obstbaumkrebs	1	3	Nach der Ernte bei Befallsbeginn	3			21		-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Birne

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3528	Geoxe	Fludioxonil	Pilzliche Lagerfäulen (ausg. Schorf)	0,15	0,45	Ab T-Stadium bis Beginn Fruchtreife	2	2	-	7	31.10.2024	3
396	Kumulus WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	Schwefel max. 14x/Jahr	7	30.09.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14			7		
3034/5	KUPFER 380 RK (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4401	Laitane	Pyrimethanil	Birnenschorf	16000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
3973	Luna Care	Fluopyram, Fosetyl	Schwarzfleckenkrankheit	1	3	Knospenschwellen bis Beginn Fruchtreife, bei Infektionsgefahr	3	3	*SDHI; max. 3 Anwendungen mit SDHI´s pro Jahr; max.2 aufeinanderfolgende Anwendungen von SDHI´s	7	15.03.2026	28
			Bakterienbrand (nur bedingt wirksam)									
			Obstbaumkrebs (nur bedingt wirksam)									
			Schorf									
			Feuerbrand (nur bedingt wirksam)									
			Echter Mehltau									
3655/901	Luna Experience SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3655	Luna Veggie	Fluopyram, Tebuconazole	Echter Mehltau	0,125	0,375	Grünknospenstadium bis 50% Fruchtgröße	2	Nur eine Variante erlaubt	Max. 0,75l Produkt/ha/Jahr, keine weiteren Behandlungen mit Tebuconazol	7	30.06.2027	14
			Schorf	0,25	0,75	Grünknospenstadium bis 50% Fruchtgröße	1			-		
			Lagerkrankheiten	0,25	0,75	60% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	1					
			Schwarzfleckenkrankheit	0,25	0,75	Blüheginn bis 50% Fruchtgröße	1					
3074	Malvin WG	Captan	Schorf	0,625	1,875	Knospenaufbruch bis 90% Fruchtgröße	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	15.11.2025	14
3255	Mavita 250 SC	Siehe Score (3255), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3820	Merpan 48 SC	Captan	Schorf	1	3	Bei Infektionsgefahr	5	5	Captan max. 5x/J	7	15.11.2025	21
2803	Merpan 80 WDG	Captan	Pilzliche Lagerfäulen	0,75	2,25	10mm Fruchtdurchm. bis Beginn Fruchtreife	3	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	4	31.05.2024	21
			Schorf	0,63	1,88	Ab Knospenaufbruch bei Infektionsgefahr	5			7		
4187	Merplus	Captan, Kaliumphosphonat	Birnenschorf	0,8	2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	8	8	-	15	31.07.2024	28

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Birne

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3701	Microthiol WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,67	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	30.12.2024	7
			Schorf	2,67	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14			7		
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.03.2026	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
2915	Netzschwefel Stulln	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	30.09.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
2915/901	Netz-Schwefelit WG	Siehe Netzschwefel Stulln (2915), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/902	Pilz-frei Cuprofor (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3962	Pomax	Pyrimethanil + Fludioxonil	Bitterfäule, Grauschimmel, Fruchtmonilia	0,64	1,6	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine		15.03.2026	3
4399	Pretil	Pyrimethanil	Birnenschorf	16000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
4366	Pyramid	Pyrimethanil	Schorf	0,45	1,125	Ab Knospenaufbruch bis Nachblütefruchtfall	3	3	*Anilinopyrimidine; max. 4x Anilinopyrimidine pro Jahr	5	30.04.2024	56
4400	Pyrogal	Pyrimethanil	Birnenschorf	16000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
2997	Pyrus	Pyrimethanil	Schorf	0,33	1	Knospenaufbruch bis Blühende	3	3	*Anilinopyrimidine; Pyrimethanil max. 3x/Jahr	7	30.04.2024	56
3366	Regalis Plus (100g WS/kg)	Prohexadion-Calcium	Feuerbrand- Sekundärinfektionen	0,83	2,5	Während Blüte (1.Anw.fenster)	5	6	Prohexadion-Calcium max. 6x/Jahr, in Summe max. 300g WS /ha und Jahr	-	31.12.2024	55
			Feuerbrand- Sekundärinfektionen	0,5	1,5	10 mm Fruchtdurchmesser bis 50% Fruchtgröße (2.Anw.fenster)	3					
4287	Revyona	Mefentrifluconazole	Apfelschorf, Birnenschorf, Apfelmehltau (befallsmindernd)	15.000m² LWF*	2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	2	nur eine Variante erlaubt	*DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI´s pro Jahr	7	20.03.2030	28
			Apfelschorf, Birnenschorf, Apfelmehltau (befallsmindernd)	18.000m² LWF*	2,34	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	1			-		
			Schwarzfleckenkrankheit	15.000m² LWF*	2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	2			7		
			Schwarzfleckenkrankheit	18.000m² LWF*	2,34	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	1			-		
3578/901	Sanax	Siehe VitiSan (3578), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4398	Eurune 40 SC	Pyrimethanil	Birnenschorf	16.000m² LWF*	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	1	1	*Anilinopyrimidine; max. 3x Anilinopyrimidine pro Jahr	-	30.04.2024	56
3938	Scab 480 SC	Captan	Schorf	1,04	3,125	Ende Blüte bis T-Stadium	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	15.11.2025	21

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3638	Scab 80 WG	Captan	Schorf	0,63	1,88	Ab Knospenaufbruch	5	5	*FRAC M04; Captan und Folpet in Summe max. 5x/J	7	15.11.2025	21
3064	Scala	Pyrimethanil	Schorf	0,375	1,125	Ab Knospenaufbruch bis 70% Fruchtgröße	3	3	*Anilinopyrimidine; max. 4x Anilinopyrimidine pro Jahr	7	30.04.2024	56
			Grauschimmel, Bitterfäule, Monilia-Fruchtfäule (zur Befallsminderung)	15000m² LWF*	1,5	90% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	3			10		7
3255	Score	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn, bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	31.12.2024	28
4001	Sekvenca	Difenoconazol	Schorf	0,075	0,225	Ab Blühbeginn, bei Infektionsgefahr	4	4	*DMI	5	31.12.2024	28
3796	Sercadis	Fluxapyroxad	Schorf	0,08	0,25	Ab Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife	3	3	*SDHI	7	31.05.2026	35
3536	Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	Feuerbrand (nur bedingt wirksam)	2,67	8	Blühbeginn bis 90% Fruchtgröße, bei Infektionsgefahr	6	6	-	3	-	-
3074/901	Sigma 80 WG	Siehe Malvin WG (3074), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.07.2024	
4378	Sinclaire	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
4306	Society	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Bei Infektionsgefahr, Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	31.10.2024	3
4355	Speech	Cyprodinil+Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	15.03.2026	3
3275	STAR Penconazol	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2576	Stroby	Kresoxim-methyl	Birnenschorf	0,067	0,2	Knospenaufbruch bis Beginn Fruchtreife, bei Infektionsgefahr	3	3	*Strobilurine; max. 3x Strobilurine/ Jahr, keine aufeinanderfolgenden Anwendungen mit Strobilurinen	7	31.12.2025	28
2619	Switch	Cyprodinil + Fludioxonil	Lagerkrankheiten, außer Schorf	0,25	0,75	Fruchtreife bis Ernte	1	1	*Anilinopyrimidine	-	31.07.2024	3
2889	Talendo	Proquinazid	Echter Mehltau	22500m² LWF*	0,375	Mausohrstadium bis 50% Fruchtgröße	3	3	Keine aufeinanderfolgenden Anwendungen	14	31.07.2024	49
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	-	7	31.07.2024	7
			Schorf	2,7	8	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14					
3275	Topas	Penconazol	Echter Mehltau	0,125	0,375	Ab Blühbeginn bei Befallsbeginn	3	3	*DMI; Penconazol max. 3x/Jahr	6	31.12.2026	14
3528	Treso	Siehe Geoxe (3528), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3578	VitiSan	Kaliumhydrogen-carbonat	Schorf	2,5	7,5	Mausohrstadium bis Beginn Fruchtreife	6	6	-	3	-	-
3034/6	Zetaram Plus	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Zulässige Herbizide (Birne)

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
2928	Agil-S	Propaquizafop	Einjährige 1-keimblättrige Unkräuter, ausgenommen einjährige Rispe	-	0,75	Nach dem Auflaufen der Ungräser	1	1	-	-	30.11.2024	30
			Quecke	-	1,5	Nach dem Auflaufen der Quecke	1					
2928/1	Agil 100 EC	Siehe Agil-S (2928), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691/2	Agro Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052/3	Agro MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/901	Barbarian Super 360 (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768	Beloukha	Pelargonsäure	Wurzelschosser	-	16	Während der Vegetationsperiode	2	2	-	14	31.08.2024	-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Während der Vegetationsperiode	2			14		-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Vor dem Pflanzen	2			7		-
2948	Boom efekt (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	-	35
2798/902	Campus	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/902	Clinic Grade (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.06.2024	
3526/901	Clinic TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Durano (3526), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 30.06.2024	
4467	Clinic Xtreme (540g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J		15.12.2024	
3052	Dicopur M	MCPA	Ackerkratzdistel, Ackerwinde	-	2	Frühjahr und Sommer, ab 1. Standjahr	2	-	-	60	31.10.2024	-
3526	Durano (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer (während der Vegatationsperiode), ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
4406	Durano SL (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, ab dem Pflanzjahr	-	3	Frühjahr bis Sommer	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	28	15.12.2024	28
3526/904	Durano TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Durano (3526), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Flexidor	Isoxaben	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	-	1	Frühjahr-Vorblüte, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	31.12.2024	-

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM-Register/ Stand 15.02.2024

Birne

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3964	Frequent	Fluazifop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	-	1	Während Vegetationsperoide	1	1	-	-	31.12.2024	28
			Quecke		2	Während Vegetationsperoide	1			-		
2790	Fusilade MAX	Fluazifop-P	Einjährige 1-keimblättrige Unkräuter, ausge. einjährige Rispe	-	1	Bis Reifebeginn	1	-	-	-	31.12.2024	28
			Quecke	-	2	Bis Reifebeginn	1			-		
3630	Gallup Biograde (360 g/l) (bienengefährlich)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	-	15.12.2024	-
4473	Glister Ultra (360g/l Glyphosat)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Herbst nach Laubfall oder Frühjahr vor Austrieb, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	16.12.2024	-
2651	Glyfos (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	Aufbrauchsfrist 15.12.2025	42
3631	Glypho-Rapid 450 (450 g/l)	Glyphosate	Einjährige 1- und 2-keimblättrige Samenunkräuter	-	3,2	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 1x/Jahr	-	15.12.2024	-
2948/ 902	Glyphoxx 360 TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798/ 901	Grometa	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2907	Kabuki	Pyraflufen-ethyl	Wurzelschosser	-	0,8	Ab dem 2. Standjahr	2	-	-	14	-	-
3768/901	Kalina	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768/902	Katamisa	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3215	Kerb Flo	Propyzamid	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	6,25	Winter/ Vegetationsruhe, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	-	-
2948/901	Landmaster 360 TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3599	Nasa (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Ab Pflanzjahr, Frühjahr oder Sommer	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
4139	Naprop 450	Napropamid	Einjähr. 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Nach dem Pflanzen und vor dem Auflaufen der Unkräuter	1	1	Nur in Junganlagen, Baumschulen	-	Aufbrauchsfrist 31.12.2024	-
2798	Orefa Di-Amide-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Rodixelf	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2948/903	Rosate Clean 360 (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4471	Roundup Future (500g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	2,4	Frühajhr bis Sommer	3	3	Glyphosate max. 3x/J, max. 3600gWS/ha/J; max. 50% der Fläche behandeln	28	15.03.2024	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
3437	Roundup PowerFlex (480 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	3,33	Frühjahr oder Sommer	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	15.12.2024	42
2798	Spectrum	Dimethenamid-p	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter, einj. Rispe, Hirse-Arten	-	1,4	Bis T-Stadium oder Nachernte, ab 1. Standjahr	1	1	-	-	-	-
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3692	Shyfo (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	4	Frühjahr oder Sommer, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	-	15.12.2024	42
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	STAR Dimethenamid-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	STAR Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	STAR MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3107	Stomp Aqua	Pendimethalin	Einjährige 2-keimbl. Unkräuter nicht im Pflanzjahr	-	3,5	Während Vegetationsp. bis T-Stadium	1	Nur eine Variante erlaubt	In Summe max. 3,5l Produkt/ha/J; nicht im Pflanzjahr anwenden	-	-	-
				-	1,75	Rotknospe bis T-Stadium	2			14		
				-	3,5	Wachstum der Langtriebe abgeschlossen bis Ende Laubfall	1			-		
3014	Taifun forte (360 g/l)	Glyphosate	1 und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Während Vegetationsperoide, ab Pflanzjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	-	15.12.2024	42
2809	Touchdown Quattro (360 g/l)	Glyphosate	1 und 2-keimblättrige Unkräuter, außer Ackerwinde	-	4	Während Vegetationsperoide, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	-	15.12.2024	42
3014/1	Turbo Glyphos (360g/l Glyphosate)	Siehe Taifun forte (3014), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/902	Vidia (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2809/901	Vorox Unkrautfrei Direkt (360g/l Glyphosate)	Siehe Touchdown Quattro (2809), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2928/901	Zetrola	Siehe Agil-S (2928), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
Wachstumsregler, Fruchtausdünnmittel, Mittel zur Förderung der Blütenbildung und zur Verhinderung der Berostung (Birne)												
3661	Brevis	Metamitron	Fruchtausdünnung	0,73	2,2	Blühende bis Fruchtdurchmesser 20mm	1	1	-	-	30.11.2027	60
4380	Cube	Gibberellinsäure	Förderung Fruchtgröße u. Frruchtansatz	2 Tabl.	5 Tabl.	Blühbeginn bis Blühende	1	1	-	-	31.08.2024	-
3889	Dirabel (84,67g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.600m² LWF*	0,24	Ab Beginn Fruchtreife	2	-	-	7	31.12.2024	7
4020	Dirager (37g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.400m² LWF*	0,541	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	2	2	-	7	31.12.2024	7
3335	Exilis	6-Benzylaldenin	Fruchtausdünnung, Förderung Fruchtgröße	3,75	7,5	10 - 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	6-Benzyladenin max. 1x/Jahr	-	31.05.2025	-
4779	Exilis 100 SC	6-Benzylaldenin	Fruchtausdünnung, Förderung Fruchtgröße	0,75	1,5	10 - 20mm Fruchtdurchmesser	1	1	6-Benzyladenin max. 1x/Jahr	-	31.05.2025	-
3899	Fixor (100g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	0,06	0,15	Ab Beginn Fruchtreife	2	2	-	7	01.10.2025	7
4022	Fruit Auxin 30 SL (30,2g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	9.800m² LWF*	0,662	Ab Beginn Fruchtreife bis Ernte	2	2	-	7	31.12.2024	7
3789	Florgib Tablet	Gibberellinsäure	Förderung des Fruchtansatzes	3 Tabl.	6 Tabl.	Während der Blüte	1	1	Gibberellinsäure max. 1x/J	-	31.08.2024	-
3549	Fruitone (80g WS/l)	Naphthyl-1-essigsäure	Verhinderung vorzeitigen Fruchtfall	0,083	0,25	Vor der Ernte	2	2	Naphthyl-1-essigsäure max. 2x/Jahr	7	01.08.2026	7
3280	Gibb 3	Gibberellinsäure	Förderung Fruchtansatz	5	15 Tabl.	Während Blüte	1	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	-	31.12.2024	-
			Förderung Fruchtansatz	2,5	7,5 Tabl.	Während Blüte	2			7		
3279	Gibb plus	Gibberellin GA4 + GA7	Förderung des Fruchtansatzes	0,5	1,5	Während der Blüte	1	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	-	15.07.2026	-
				0,25	0,75	Während der Blüte	2			7		
4202	Giber Gobbi 10	Gibberelinsäure	Förderung Fruchtansatz	0,04	0,12	20% Blüten geöffnet bis Blühende	1	1	-	-	31.08.2024	-
4203	Gobbi Gib 4 LG	Gibberelinsäure	Förderung Fruchtansatz	0,1	0,3	20% Blüten geöffnet bis Blühende	1	1	-	-	31.08.2024	-
3419	MaxCel	6- Benzyladenin	Fruchtausdünnung	3,75	7,5	7- 15mm Fruchtdurchmesser	1	1	-	-	31.12.2025	-
3469	Novagib	Gibberellin GA4 + GA7	Förderung Fruchtansatz	0,4	1,2	Während der Blüte	1	Var. 1 oder Var. 2 wählen	-	-	15.07.2026	-
				0,2	0,6	Während der Blüte	2			3		
4220	Promalin	6-Benzyladenin, Gibberellin GA4 + GA7	Förderung Fruchtansatz	0,16	0,4	Rotknospenstadium bis Blühende	2	2	-	7	31.08.2024	-
3366	Regalis Plus (100g WS/kg)	Prohexadion-Calcium	Hemmung des Triebwachstums	0,83	2,5	Während Blüte (1.Anw.-fenster)	5	6	Prohexadion-Calcium max. 6x/Jahr, in Summe max. 300g WS / ha und Jahr	-	31.12.2024	55
				0,5	1,5	10 mm Fruchtdurchm. bis 50% Fruchtgröße (2.Anw.-fenster)	3			-		
3400	Regulex 10 SG	Gibberellin GA4 + GA7	Förderung Fruchtansatz	0,05	0,225	Ab 20% der Blüten geöffnet bis 30% der Blüten geöffnet	1	1	-	-	31.08.2025	-

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg je m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) / ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendung mit Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist in Tagen
Rodentizide, Wildverbissmittel (Birne)												
4167	Arvalin	Zinkphosphid	Feldmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
				50g/ Köderst.	2	Bei Bedarf	3		nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
4142	Arvalin Forte	Zinkphosphid	Feldmaus	4 Pellets pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
4101	Arvalin Phos	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	1 Tablette/8-10m Ganglänge		bei Befall	4	4	Köder*	7	31.08.2024	-
3011	Certosan	Blutmehl	Verbiss d. Rehwild/ Hasen	s. Zul.	20kg/ha	Frühjahr bis Sommer oder Herbst	2	2	-	28	31.03.2037	-
4218	Delu Wühlmausgas	Calciumcarbid	Wühlmaus	5g pro Loch		Bei Befall	-	-	Verdecktes Auslegen in Gänge/Löcher	-	31.08.2024	-
			Maulwurf	20g pro Loch		Bei Befall	-	-				
2703/902	Detia Wühlmausköder Neu	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4167/901	Giftweizen Arvastop	Siehe Arvalin (4167), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3770	Quickphos Pellets WM	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	5-10 Pellets/Gang			1	1	Köder*	-	30.11.2027	-
4088	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
				100g / Köderst.	2,5	Bei Bedarf	1		nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3975	Ratron Giftweizen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
3937	Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid	Wühlmaus	1 Köder/ 5m Gang	5	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	30.04.2025	-
				1 Köder/ Köderst.	5	Bei Bedarf	1		nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3364	Wöbra	Quarzsand	Schäl- und Nageschutz gegen Feldhasen	250 g/Stamm		Ganzjährig	1	1	Quarzsand 1x/J	-	-	-
2703	Wühlmausköder	Zinkphosphid	Wühlmaus	5g je 8m Gang		Bei Befall	-	-	Köder*	-	31.12.2024	-
2703/903	Wühlmaus-Köder	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2703/901	Wühlmausköder Arrex	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										