

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
----------	--------------------	-----------	-------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------------	-----------------

*Erklärungen:												
Köder		Mittel muss tief und unzugänglich für Vögel und Säugetiere in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Mittel an der Oberfläche zurückbleiben!										
LWF		Dosierung nach Laubwandfläche. Aufwandmenge nach Laubwandfläche (LWF) berechnen.										
DMI (FRAC 3)		Folgende Wirkstoffe gehören zu den DMI's (SSH): Difenconazol, Penconazol, Tebuconazol, Tetraconazol, Myclobutanil, Mefentrifluconazol										
SDHI (FRAC 7)		Folgende Wirkstoffe gehören zu den SDHI's: Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyrazam										

Insektizide und Akarizide (Süßkirsche/ Weichsel, PRNAV/ PRNCE)

3383	Afinto (<i>bienengefährlich</i>)	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl	Spinnmilbe (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen (51) bis Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben (54)	1	1	---	---	15.08.2026	---
2633	Austriebsspritzmittel Promanal Neu	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen (51) bis Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben (54)	1	1	Paraffinöl max. 1x/J	---	15.08.2026	---
			Schildläuse (überwinternde Stadien)	10	30	Knospenschwellen (51) bis Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben (54)	1			---		
3431	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383/901	Hinode (<i>bienengefährlich</i>)	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3001	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradeanol, Tetradecen	Schalenwickler, Apfelwickler	max 1000 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
3002	Isomate OFM rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pfirsichwickler	max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
			Pflaumenwickler	max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1			---		
3657	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Pfirsichmotte, Wickler	0,33	1	Ab Larvenschlupf	3	3	---	7	---	---
3809	Madex Twin	Apfelwickler Granulosevirus	Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Larvenschlupf	6	6	---	6	---	---
2568/902	Micula	Siehe Schädlingfrei Obst und Gemüse Konzentrat (2568), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2620	Mimic	Tebufenozid	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf, Ballonstadium (59) bis Blühende (69)	1	1	---	---	31.01.2028	---
2830	Mospilan 20 SG	Acetamiprid	Kirschfruchtfliege	0,125	0,375	50% Fruchtgröße (75) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	1	1	Max. 1 Anwendung mit Acetamiprid pro Jahr	---	---	7
			Blattläuse	0,125	0,25	Bei Befallsbeginn	1			---		
2830	Mospilan SG	Siehe Mospilan (2830), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2699	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Bei Befallsbeginn bis Beginn Blüte (61)	1	3	---	---	31.01.2028	7
			Blattläuse	1,5	4,5	Ab Kelchblätter geöffnet (57), bei Befallsbeginn	3			7		
			Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Ab Kelchblätter geöffnet (57), bei Befallsbeginn	3			7		

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	I bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2720	Nemahelp	Entomopathogene Nematoden	Pflirschwickler, Kleiner Fruchtwickler	1,5 Mrd.	max. 5 Mrd.	ab Ende Laubfall (97)	nach Bedarf		Spritzen auf Stamm und Hauptäste	-	31.01.2040	-
			Pflaumenwickler	1,5 Mrd.		ab Ende Laubfall (97)	nach Bedarf					
			Kirschfruchtfliege	-		bei Befall	nach Bedarf		Spritzen oder Gießen auf den Boden			
2622	Neudosan Neu Blattlausfrei	Kali-Seife	Blattläuse	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	---	7	01.12.2027	---
			Spinnmilben	10	30	Bei Befallsbeginn	5			7		
2622/903	Neudosan Neu	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3354	Para Sommer	Paraffinöl	Spinnmilben (ab Wintererier)	15	45	Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben (54) bis Ballonstadium (59)	1	1	Paraffinöl max. 1x/J	---	15.08.2026	---
1739/901	Parafex 830 EC	Siehe Austriebsspritzmittel 7 E (1739), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2488	Phyton	Raubmilbe	Spinnmilben	5-25/m²		Ab Befallsbeginn	---	---	---	14	30.09.2034	---
3878	RAK 3+4	Codlemone, Tetradecylacetat	Fruchtschalenwickler	500 Stk./ha		Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	1	1	---	---	---	---
4477	Raptol HP (<i>bienengefährlich</i>)	Pyrethrine	Blattläuse	0,7 l / 10.000m²	1,05	Ballonstadium (59) bis Genussreife (89)	2	2	*LWF; In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur abends nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	5	15.06.2027	3
			Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Wickler)	0,7 l / 10.000m²	1,05	Erste Laubblätter entfaltet (11) bis Genussreife (89)	2					
			Kirschkernstecher	0,7 l / 10.000m²	1,05	Erste Laubblätter entfaltet (11) bis Genussreife (89)	2					
			Echte Blattwespen (Larven)	0,7 l / 10.000m²	1,05	Erste Laubblätter entfaltet (11) bis Genussreife (89)	2					
4477/901	Raptol HP	Siehe Raptol HP (4477), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.03.2026	
2568	Schädlingsfrei Obst u. Gemüse Konzentrat	Rapsöl	Spinnmilben, Obstbaumspeinnmilbe (Rote Spinne)	10	---	Bei Befallsbeginn	2	2	Wenn Spinnmilbenindikation max. 2x, ansonsten max. 3x	7	31.03.2027	---
			Gallmilben	10	---	Bei Befallsbeginn	3	3				
			Schwarze Kirschenblattlaus	10	---	Bei Befallsbeginn	3					
2868	Spical	Raubmilbe	Spinnmilben	25-200 Milben/m²		Bei Befallsbeginn	---	---	---	7	31.10.2031	---
3383	Teppeki (<i>bienengefährlich</i>)	Fonicamid	Blattläuse	0,07	0,14	Ab erste Laubblätter entfaltet (11)	2	2	In/ Bei blühenden Kulturen/ Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	21	31.08.2027	14
3042	Tyron	Raubmilbe	Gemeine Spinnmilbe, Obstbaumspeinnmilbe	1000-1500 Stk.		Jänner - Februar	1	---	---	---	31.12.2036	---
3431	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	Ab Erste Blüten offen (60), ab Larvenschlupf	2	2	---	10	---	8
3431/3	XenTari WG	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
Fungizide und Bakterizide (Süßkirsche/ Weichsel, PRNAV/ PRNCE)												
3450/901	Alcoban 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3966	Badge WG (nur Süßkirsche!, 280g Cu/kg) (bienengefährlich)	Kuopferhydroxid, Kupferoychlorid	Blütenmonilia, Schrotschusskrankheit	1,75	3,12	Triebwachstum abgeschlossen (91) bis Ballonstadium (59)	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J (Durchrechnungszeitraum s. Register) Keine Anwendung in/ bei blühenden Kulturen/ Unterwuchs	14	30.06.2030	---
4053	Botrefin	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilia	0,3	0,9	Kelchblätter geöffnet (57) bis Blühende (69) und Beginn Fruchtreife (81) bis Genussreife (89)	3	3		10	15.03.2026	14
3966/901	Coprantol Duo (280g Cu/kg) (bienengefährlich)	Siehe Badge WG, abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404/901	Cumatol (250g Cu/l)	Siehe Funguran progress (3404), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405/901	Cupravit (350g Cu/kg)	Siehe Cuprozin Progress (3405), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/9	Cupro-Flow (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/901	Cuprofor flow (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405	Cuprozin progress (250g Cu/l)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium (59)	3	3	In Summe max. 4kg. Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Nach der Ernte- ab Triebwachstum abgeschlossen (91), bei Infektionsgefahr	3					---
			Ast- und Baumsterben (zur Befallsminderug)	1,4	4,2	Nach der Ernte- ab Triebwachstum abgeschlossen (91) bis Ballonstadium (59)	3					---
			Pseudomonas (Bakterienbrand)	---	4	Nach der Ernte- ab Triebwachstum abgeschlossen (91) bis vor der Blüte- Ballonstadium (59) (Streichenanwendung)	3					---
3450	Delan WG	Dithianon	Sprühfleckenkrankheit, Kirschenschorf	0,25	0,5	Blühbeginn (61) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	3	3	---	7	31.01.2028	21
			Blattbräune, Schrotschusskrankheit	0,25	0,5	Blühbeginn (61) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	3			7		---
			Sprühfleckenkrankheit, Kirschenschorf	0,25	0,5	Triebwachstum abgeschlossen (91) bis 50% Blätter abgefallen (95)	1			---		---
			Blattbräune, Schrotschusskrankheit	0,25	0,5	Triebwachstum abgeschlossen (91) bis 50% Blätter abgefallen (95)	1			---		---
3450	Delan 70 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3450/4	Delan 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2758	Flint	Trifloxystrobin	Blattbräune	0,167	0,5	Bei Infektionsgefahr	1	1	Trifloxystrobin max. 1x/J	---	Aufbrauchsfrist 12.07.2027	7
3034	Flowbrix (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Schrotschusskrankheit	1,1	3,3	Nach der Ernte- Wachstum abgeschlossen (91) bis Knospenaufbruch (53)	4	4	In Summe max. 4kg. Reinkupfer/ha/J	7	---	---
3034/2	Flowbrix (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 20.06.2026	
3034/4	Flowbrix Trace (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 20.06.2026	

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3404	Funguran progress (350g Cu/kg)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium (59)	3	3	In Summe max. 4kg. Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Nach der Ernte- ab Triebwachstum abgeschlossen (91), bei Infektionsgefahr	3					
4585	Grifon SC (nur Süßkirsche!, 272g Cu/l) (bienengefährlich)	Kupferhydroxid + Kupferoxychlorid	Blütenmonilia (Spitzendürre), Fruchtmonilia	1,2	3,6	Triebwachstum abgeschlossen (91) bis Geschlossene Einzelblüten am Knospengrund (55)	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J, Keine Anwendung in/ bei blühenden Kulturen/ Unterwuchs	14	31.12.2026	-
3399	Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	Blütenmonilia (Spitzendürre), Fruchtmonilia	1,5	4,5	Erste Blüten offen (60) bis Beginn Fruchtreife (81)	6	6	---	8	31.10.2037	1
396	Kumulus WG	Schwefel	Sprühfleckenkrankheit	2	6	Abgehende Blüte (67) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	5	5	---	10	31.07.2027	14
3034/5	KUPFER 380 RK (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 20.07.2027	
3655/901	Luna Experience SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3655/1	Luna Experience 400 SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3603/1	Luna Sensation 500 SC	Siehe Luna Sensation (3603), abweichende Zulassung möglich (s. PSM-Register)										
3603	Luna Sensation	Fluopyram, Trifloxystrobin	Echte Mehltaupilze	0,1	0,3	Blühende (69) bis 50% Fruchtgröße (75)	2	2	*SDHI; max. 3x/J SDHI's	7	30.06.2027	7
			Sprühfleckenkrankheit	0,133	0,3	Abgehende Blüte (67) bis Pflückreife (87)	2			7		
3655	Luna Veggie	Fluopyram, Tebuconazole	Monilia-Spitzendürre, Fruchtmonilia	0,2	0,6	Ballonstadium (59) bis Pflückreife (87)	1	1	*SDHI; *DMI; Tebuconazol max. 1x/J	---	30.06.2027	14
3255/901	Mavita 250 SC	Siehe Score (3255), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2803	Merpan 80 WDG	Captan	Sprühfleckenkrankheit	0,29	0,88	Ab Nachblütefruchtfall (71)	3	3	Captan max. 3x/ J Blühende Unterkulturen beseitigen	7	---	21
3680	Prestop	Gliocladium catenulatum	Blütenmonilia	0,66	2	Ballonstadium (59) bis Blühende (69)	4	4	---	3	---	28
4522	Problad	Süßlupine-Extrakt (Lupinus albus)	Echte Mehltaupilze (nur bedingt wirksam)	1,07	3,2	Blühbeginn (61) bis Pflückreife (87)	3	3	---	7	27.04.2037	---
			Blütenmonilia, Fruchtmonilia (nur bedingt wirksam)	1,07	3,2	Blühbeginn (61) bis Pflückreife (87)	3			7		
3353	Prolectus	Fenpyrazamine	Blütenmonilia, Spitzendürre (zur Befallsminderung)	0,27	0,8	Blühebeginn (61) bis Blühende (69)	3	3	Fenpyrazamine max. 3x/J	7	Aufbrauchsfrist 15.07.2026	1
			Fruchtmonilia	0,4	1,2	Ab 50% Fruchtgröße (75) bis Pflückreife (87)	3					
4287	Revyona	Mefentrifluconazole	Monilia-Fruchtfaule	11 / 10.000m²	1,8	Nachblütefruchtfall (71) bis Genussreife (89)	2	2	*LWF; *DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI's pro Jahr	7	20.03.2030	3
			Blütenmonilia	11 / 10.000m²	1,8	Geschlossene Einzelblüten am Knospengrund (55) bis Blühende (69)	2					
4287/1	Revyson	Siehe Revyona (4287), abweichende Zulassung möglich (s. PSM-Register)										
3064	Scala	Pyrimethanil	Blütenmonilia	11 / 10.000m²	1,5	Geschlossene Einzelblüten am Knospengrund (55) bis Blühende (69)	2	2	*LWF	7	30.06.2027	14
			Fruchtmonilia	11 / 10.000m²	1,5	Nachblütefruchtfall (71) bis Genussreife (89)	2			7		14

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3255	Score	Difenoconazol	Monilia-Spitzendürre, Blattbräune, Kirschenschorf	0,075	0,225	Ab Erstse Blüten offen (60)	3	3	*DMI	7	15.03.2027	14
3796	Sercadis	Fluxapyroxad	Blütenmonilia, Fruchtmonilia	0,2 l / 10.000m²	0,3	Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Genussreife (89)	2	2	*LWF; *SDHI	7	31.10.2028	3
3536	Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	Blütenmonilia, Fruchtmonilia, Botrytis (zur Befallsminderung)	2,7	8	Knospenschwellen (51) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	6	6	---	5	---	---
3199	Signum	Pyraclostrobin, Boscalid	Blütenmonilia	0,25	0,75	Zu den Stadien: Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57), Vollblüte (65), Blühende (69)	3	3	*SDHI	7	15.09.2026	7
			Monilia-Fruchtfäule	0,25	0,75	Ab ca. 50% Fruchtgröße (75)	3			10		
			Blattbräune	0,25	0,75	Ab Ballonstadium (59)	3			10		
			Sprühfleckenkrankheit	0,25	0,75	Ab Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben (72)	3			10		
3199	Signum WG	Siehe Signum (3199), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4378	Sinclair	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Blühende (69) und Beginn Fruchtreife (81) bis Genussreife (89)	3	3	---	10	15.03.2026	14
4306	Society	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Blühende (69) und Beginn Fruchtreife (81) bis Genussreife (89)	3	3	---	10	15.03.2026	14
4355	Speech	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Blühende (69) und Beginn Fruchtreife (81) bis Genussreife (89)	3	3	---	10	30.09.2027	14
2619	Switch	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Blühende (69) und Beginn Fruchtreife (81) bis Genussreife (89)	3	3	---	10	15.03.2026	14
3690	Teldor WG (<i>bienengefährlich</i>)	Fenhexamid	Monilia-Fruchtfäule, Grauschimmel	0,5	1,5	50% Fruchtgröße (75) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	2	2	In/Bei blühenden Kulturen/ Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	10	31.12.2032	3
			Monilia-Spitzendürre	0,5	1,5	Kelchblätter geöffnet, Spitzen der Blütenblätter sichtbar (57) bis Blühende (69)	2			7		
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	7,5	Erste Laubblätter spreizen sich ab (10) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	10	10	---	7	15.04.2026	7
			Schrotschusskrankheit	2,7	7,5	Erste Laubblätter spreizen sich ab (10) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	10					
3578	VitiSan	Kaliumhydrogen-carbonat	Schrotschusskrankheit	2,5	7,5	Erste Blüten offen (60) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	6	6	---	3	31.10.2037	---
			Echter Mehltau	3,34	10	Erste Blüten offen (60) bis Fortgeschrittene Fruchtausfärbung (85)	6			3		
3034/6	Zetaram Plus	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartelist Tage
----------	--------------------	-----------	-------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------------	----------------

Herbizide (Süßkirsche/ Weichsel, PRNAV/ PRNCE)

2691/2	Agro Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	Agro MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/901	Barbarian Super (360 g/l Glyphosate) (bienengefährlich)	Siehe Gallup Biograde (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768	Beloukha	Pelargonsäure	Wurzelschoss	---	16	Während der Vegetationsperiode	2	2	---	14	01.12.2027	---
			Einjährige Risse, einj. 2-keimbl. Unkräuter	---	16	Während der Vegetationsperiode	2			14		---
			Einjährige Risse, einj. 2-keimbl. Unkräuter	---	16	Vor dem Pflanzen	2			7		---
2948	Boom efekt (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	4	Während Vegetationsperioide, ab 2. Standjahr	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	60	---	42
2798/902	Campus	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4467	Clinic Xtreme (540g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	5,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	---	---	---
4467/1	Credit Xtreme	Siehe Clinic Xtreme (4467), abweichende Zulassung möglich (s. PSM- Register)										
3052	Dicopur M	MCPA	Ackerkratzdistel, Ackerwinde	---	2	Frühjahr u. Sommer, ab dem 1. Standjahr	2	---	---	60	15.08.2027	---
4406	Durano SL (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, ab dem Pflanzjahr	---	3	Frühjahr bis Sommer	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	28	---	28
2691	Flexidor	Isoxaben	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	1	Vor der Blüte bis Ballonstadium (59), ab Pflanzjahr	1	1	---	---	31.01.2028	---
3964	Frequent	Fluazifop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	---	1	Während Vegetationsperiode	1	1	---	---	31.05.2027	28
			Quecke	---	2	Während Vegetationsperiode	1		---	---		
2790	Fusilade MAX	Fluazifop-P	Einj. 1-keimblättrige Unkräuter, (ausg. einjährige Risse)	---	1	Bis 90% Fruchtgröße (79)	1	---	---	---	31.05.2027	28
			Quecke	---	2	Bis 90% Fruchtgröße (79)	1		---	---		
3630	Gallup Biograde (360 g/l) (bienengefährlich)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	4	Während Vegetationsperioide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	---	---	---
4473	Glistar Ultra (360g/l Glyphosat)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	5	Herbst nach Laubfall oder Frühjahr vor Knospenaufbruch, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	---	---
3631	Glypho-Rapid 450 (450 g/l Glyphosate)	Glyphosate	Einjährige 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,2	Während Vegetationsperioide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 1x/J	---	---	---
2948/902	Glyphox 360 TF (360 g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2907	Kabuki	Pyraflufen-ethyl	Wurzelschoss	---	0,8	Ab dem 2. Standjahr	2	---	---	14	---	---
3215	Kerb Flo	Propyzamid	Einjährige 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	6,25	Winter (während der Vegetationsruhe), ab 1. Standjahr	1	1	---	---	---	---

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	l bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2948/902	Landmaster 360 TF (360 g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798/2	Orefa Di-Amide-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 22.05.2026	
2907/1	Piramax EC	Siehe Kabuki (2907), abweichende Zulassung möglich (s. PSM-Register)										
3315/1	Propy 400 SC	Siehe Kerb Flo (3215), abweichende Zulassung möglich (s. PSM-Register)										
2691	Rodixelf	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2948/903	Rosate Clean 360 (360 g/l WS)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4471	Roundup Future (500g/l WS)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	2,4	Frühjahr bis Sommer	3	3	Glyphosate max. 3x/J, max. 3600gWS/ha/J; max. 50% der Fläche behandeln	28	---	---
2798	Spectrum	Dimethenamid-p	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter, einj. Rispe, Hirse-Arten	---	1,4	Bis Rötelfruchtfall (73) oder nach der Ernte	1	1	nicht im Pflanzjahr	---	---	---
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 22.05.2026	
2798	STAR Dimethenamid-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	STAR Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	STAR MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3107	Stomp Aqua	Pendimethalin	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Bis Rötelfruchtfall (73), nicht im Pflanzjahr	1	nur eine Variante erlaubt	in Summe max. 3,5l Produkt /ha /J	---	---	---
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Nach der Ernte, nicht im Pflanzjahr	1			---		
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	1,75	Ballonstadium (57) bis Rötelfruchtfall (73), nicht im Pflanzjahr	2			14		
3107/4	Stomp Aqua 455 CS	Siehe Stomp Aqua (3107), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2809	Touchdown Quattro (360 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, außer Ackerwinde	---	4	Während Vegetationsperioide, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	---	42
3630/1	Vidia (360g/l Glyphosate) (<i>bienengefährlich</i>)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2809/901	Vorox Unkrautfrei Direkt (360 g/l)	Sehe Touchdown Quattro (2809), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Wachstumsregulatoren (Süßkirsche/ Weichsel, PRNAV/ PRNCE)

3951	Atonik	Natrium-o(p,5)-nitrophenolat	Verbesserung Fruchtqualität	0,2	0,6	Erste Blüten offen (60) bis 90% sortentypische Fruchtgröße (79)	3	3	---	7	31.01.2028	7
3827	Kudos	Prohexadion-Calcium	Hemmung des Triebwachstums	0,83 kg / 10.000m ²	1,25	Beginn Triebwachstum (31) bis Beginn der Fruchtreife (81)	3	3	---	14	31.05.2027	21
3789	Florgib Tablet	Gibberellinsäure	Förderung Fruchtgröße, Fruchtfestigkeit, Reifeverzögerung	12 Tab. / 10.000m ²	20 Tab.	Ab Beginn Fruchtreife (81)	1	1	*LWF	---	15.07.2026	---

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	I bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt (BBCH-Stadium)	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) Einschränkungen	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
----------	--------------------	-----------	-------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------------	-----------------

Wildverbissmittel, Rodentizide (Süßkirsche/ Weichsel, PRNAV/ PRNCE)

4167	Arvalin	Zinkphosphid	Feldmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	---	31.12.2027	---
				50g/ Köderst.	2	Bei Bedarf	3		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	---		---
4142	Arvalin Forte	Zinkphosphid	Feldmaus	4 Pellets pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	---	31.12.2027	---
4101	Arvalin Phos	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	1 Tablette/8-10m Ganglänge		Bei Befall	4	4	Köder*	7	30.11.2027	---
3011	Certosan	Blutmehl	Verbiss d. Rehwild/ Hasen	s. Zul.	20kg/ ha	Frühjahr bis Sommer oder Herbst	2	2	---	28	31.03.2037	---
4218	Delu Wühlmausgas	Calciumcarbid	Wühlmaus (Repellent zur Vergrämung)	5g pro Loch		Bei Befall	---	---	Verdecktes Auslegen in Gänge/Löcher	---	30.11.2027	---
			Maulwurf (Repellent zur Vergrämung)	20g pro Loch		Bei Befall	---	---				
2703/902	Detia Wühlmausköder Neu	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4167/901	Giftweizen Arvastop	Siehe Arvalin (4167), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3770	Quickphos Pellets WM	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	5-10 Pellets/Gang			1	1	Köder*	---	30.11.2027	---
4088	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	31.12.2027	---
				100g / Köderst.	2,5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	---		---
3975	Ratron Giftweizen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	31.12.2027	---
3937	Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid	Wühlmaus	1 Köder / 5m Gang	5	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	31.12.2027	---
				1 Köder/ Köderst.	5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	---		---
3364	Wöbra	Quarzsand	Feldhasen	250 g/Stamm		Ganzjährig,- unverdünnt streichen	1	1	Quarzsand,- Schäl- und Nageschutz	---	31.08.2039	---
2703	Wühlmausköder	Zinkphosphid	Wühlmaus	5g je 8m Gang		Bei Befall	---	---	Köder*	---	31.12.2027	---
2703/903	Wühlmaus-Köder	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2703/901	Wühlmausköder Arrex	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Die Erstellung von Fachartikeln wird durch Fördermittel von Bund, Ländern und Europäischer Union aus Fördermaßnahmen des GAP Strategieplans unterstützt.

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

WIR leben Land
Gemeinsame Agrarpolitik Österreich

